

تلشی درس پر مفهیت



- دانلود گام به گام تمام دروس 
- دانلود آزمون های قلم چی و گاج + پاسخنامه 
- دانلود جزوه های آموزشی و شب امتحانی 
- دانلود نمونه سوالات امتحانی 
- مشاوره کنکور 
- فیلم های انگیزشی 

 Www.ToranjBook.Net


 [ToranjBook_Net](https://t.me/ToranjBook_Net)

 [ToranjBook_Net](https://www.instagram.com/ToranjBook_Net)

نام درس: فیزیک ۳
نام دبیر: مهدی هاشمی
ساعت امتحان: ۱۰۰ : ۸ : ۰ صبح / عصر
مدت امتحان: ۱۰۰ دقیقه

جمهوری اسلامی ایران
اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران
اداره آموزش و پرورش شهر تهران منطقه ۱۲ تهران
دبیرستان غیردولتی پسرانه سرای دانش واحد حافظ
آزمون پایان ترم نوبت اول سال تتمیل ۹۹-۱۴۰۸

نام و نام فانوادگی:
مقطع و رشته: دوازدهم تجربی
نام پدر:
شماره داوطلب:
تعداد صفحه سوال: ۲ صفحه

ردیف	محل مهر و امضاء مدیر	نام دبیر: تاریخ و امضا:	نام دبیر: تاریخ و امضا:	نام دبیر: تاریخ و امضا:
		نام دبیر: تاریخ و امضا:	نام دبیر: تاریخ و امضا:	نمره به عدد: نمره به حروف: نمره به عدد: نمره به حروف:
۱		سوالات		
۱	۲	متجر کی که روی خط راست حرکت می کند، در لحظه $t_1 = 3\text{ s}$ در $x_1 = 5\text{ m}$ و در $t_2 = 5\text{ s}$ در $x_2 = -7\text{ m}$ و در $t_3 = 11\text{ s}$ در $x_3 = 13\text{ m}$ قرار دارد. اگر متجر فقط در $t_1 = 3\text{ s}$ تغییر جهت داده باشد: الف) مسافت طی شده توسط متجر را از t_1 تا t_3 حساب کنید. ب) تندی متوسط را از t_1 تا t_3 حساب کنید. پ) مسیر حرکت متجر را روی محور Xها با رسم شکل نمایش دهید.		
۲	۲	نمودار متجر کی که با شتاب ثابت بر روی خط راست حرکت می کند، مطابق شکل است. شتاب متجر چند متر بر مجدور ثانیه است؟		
۳	۲	 متجر کی با سرعت ثابت و در امتداد محور X در حال حرکت است. اگر متجر در مبدأ زمان در $x = -12\text{ m}$ و در $t = 3\text{ s}$ در $x = 9\text{ m}$ باشد. معادله حرکت متجر را به دست آورید.		
۴	۲	موتورسیکلتی با سرعت اولیه 36 km/h روی خط راست در حال حرکت با شتاب ثابت 1 m/s^2 است. الف) پس از طی چند متر، موتورسیکلت می ایستد؟ ب) این حرکت چند ثانیه طول می کشد؟		
۵	۲	متجر کی روی خط راست و بدون تغییر جهت، مسافت های متواالی 10 m ، 20 m و 30 m را به ترتیب با سرعت های 4 m/s و 6 m/s طی می کند. سرعت متوسط آن در این حرکت چند m/s است؟		
۶	۱	اگر شخصی درون آسانسور روی ترازو ایستاده باشد، وقتی آسانسور به سمت پایین شروع به حرکت می کند، ترازو نسبت به وزن شخص مقدار کمتری را نشان می دهد یا مقدار بیشتری؟ توضیح دهید.		
۷	۰,۵	درستی یا نادرستی عبارت زیر را تعیین کنید. اگر از مقاومت هوا صرف نظر کنیم، برای دو گلوله هم اندازه که از یک ارتفاع رها می شوند، سرعت برخورد با زمین برای گلوله ای که جرمش دو برابر گلوله دیگر است، $\sqrt{2}$ برابر گلوله سبک تر است.		

ردیف	سؤالات	نوع
۲	<p>شکل روبرو توپی را در لحظه‌ای نشان می‌دهد که در بالاترین نقطه مسیرش قرار دارد. در این لحظه جهت حرکت نشان داده شده است. اگر اندازه نیروی مقاومت هوا 0.5 N و جرم توپ 120g باشد:</p>  <p>الف) جهت نیروهای وارد بر توپ را تعیین کنید.</p> <p>ب) بزرگی شتاب را تعیین کنید. ($g = 10 \text{ N/kg}$)</p> <p>پ) جهت بردار شتاب را تعیین کنید.</p>	۸
۱	<p>نشان دهد که اندازه تکانه را می‌توان از رابطه $p = \sqrt{2mK}$ به دست آورد که در آن K انرژی جنبشی و m جرم جسم است.</p>	۹
۱	<p>آزمایشی طراحی کنید که طی آن رابطه بین نیروی خالص وارد بر یک جسم و شتاب آن بررسی شود.</p>	۱۰
۲	<p>جسمی به جرم 5kg روی سطح افقی یک میز قرار دارد و تو سط فنری با ثابت 200N/m روی سطح افقی کشیده می‌شود.</p> <p>الف) وقتی طول فنر 12cm افزایش می‌یابد، جسم در آستانه حرکت قرار می‌گیرد. ضریب اصطکاک ایستایی بین جسم و میز را حساب کنید.</p> <p>ب) اگر ضریب اصطکاک جنبشی بین جسم و سطح 0.3 باشد و شتاب جسم پس از حرکت به 1m/s^2 بر سد، تغییر طول فنر را محاسبه کنید. ($g = 10 \text{ N/kg}$)</p>	۱۱
۰,۵	<p>جاهای خالی را با عبارت مناسب پر کنید.</p> <p>در حرکت هماهنگ ساده نوسانگر جرم - فنر، انرژی نوسانگر در نقطه تعادل بیشینه می‌شود.</p>	۱۲
۱	<p>در یک حرکت هماهنگ ساده، طول پاره خط مسیر نوسانگر 10cm و بسامد نوسانگر 5Hz است. معادله حرکت این نوسانگر را در SI بنویسید.</p>	۱۳
۱	<p>در حرکت هماهنگ ساده وزنه - فنری، ثابت فنر 180N/m و جرم نوسانگر 200g است. بسامد زاویه‌ای این حرکت را حساب کنید.</p>	۱۴
صفحة ۲ از ۲		

جمع بارم: ۲۰ نمره

تلاشی در مسیر موفقیت




کلید سوالات پایان ترم نوبت اول سال تتمیلی ۹۸-۹۹

ردیف	راهنمای تصحیح	محل مهر یا امضاء مدیر
۱	<p>الف) متحرک ابتدا از x_1 رفته است و سپس بعد از تغییر جهت از x_2 تا x_3 را پیموده است:</p> $1 = \Delta x_1 + \Delta x_2 = x_2 - x_1 + x_3 - x_2 $ $= -7 \text{ m} - 5 \text{ m} + 13 \text{ m} - (-7 \text{ m}) = -12 \text{ m} + 20 \text{ m} $ $= 12 \text{ m} + 20 \text{ m} = 32 \text{ m}$ <p>(ب)</p> <p>(پ)</p> <p>$S_{av} = \frac{1}{\Delta t_T} \Rightarrow S_{av} = \frac{32 \text{ m}}{11 \text{ s} - 3 \text{ s}} = 4 \text{ m/s}$</p> <p></p>	
۲	<p>در لحظه $t = 2 \text{ s}$ سرعت متحرک صفر است:</p> $v = at + v_0 \Rightarrow 0 = 2a + v_0 \Rightarrow v_0 = -2a$ <p>در بازه زمانی $(0, 2 \text{ s})$ سرعت متوسط متحرک را به دست می‌آوریم:</p> $\bar{v} = \frac{v + v_0}{2} \Rightarrow \bar{v} = \frac{0 - 2a}{2} = -a \quad (1)$ $\bar{v} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{13 \text{ m} - 5 \text{ m}}{2 \text{ s}} = 4 \text{ m/s} \quad (2)$ <p>از طرفی در بازه زمانی $(0, 2 \text{ s})$ سرعت متوسط را از رابطه $\frac{\Delta x}{\Delta t}$ می‌توانیم به دست آوریم:</p> <p>(۱) و (۲) $\Rightarrow -a = 4 \text{ m/s}^2 \Rightarrow a = -4 \text{ m/s}^2$</p>	
۳	<p>سرعت ثابت است:</p> $v = v_{av} = \frac{\Delta x}{\Delta t} = \frac{9 \text{ m} - (-12 \text{ m})}{3 \text{ s} - 0 \text{ s}} = \frac{21 \text{ m}}{3 \text{ s}} = 7 \text{ m/s}$ <p>متحرک در مبدأ مکان در $x_0 = -12 \text{ m}$ قرار دارد؛ پس:</p> $x = vt + x_0 \Rightarrow x = 7t + (-12) = 7t - 12$	
۴	<p>(الف)</p> $v_0 = 36 \text{ km/h} = 10 \text{ m/s} \Rightarrow v_1 = 0$ $v_1^2 - v_0^2 = 2a\Delta x \Rightarrow (0 \text{ m/s})^2 - (10 \text{ m/s})^2 = 2(-1 \text{ m/s}^2)\Delta x = -100 \text{ m}^2/\text{s}^2 = (-2 \text{ m/s}^2)\Delta x$ $\Rightarrow \Delta x = \frac{100 \text{ m}^2/\text{s}^2}{2 \text{ m/s}^2} = 50 \text{ m}$ <p>(ب)</p> $v = at + v_0 \Rightarrow 0 = (-1 \text{ m/s}^2)t + 10 \text{ m/s}$	
۵	<p>سرعت متوسط برابر با جابه‌جایی کل تقسیم بر زمان کل است؛ پس اول به سراغ محاسبه زمان هر یک از جابه‌جایی‌ها می‌رویم:</p> $\Delta t_1 = \frac{\Delta x_1}{v_1} = \frac{10 \text{ m}}{2 \text{ m/s}} = 5 \text{ s}$ $\Delta t_2 = \frac{\Delta x_2}{v_2} = \frac{2 \text{ m}}{4 \text{ m/s}} = 5 \text{ s}$ $\Delta t_3 = \frac{\Delta x_3}{v_3} = \frac{30 \text{ m}}{6 \text{ m/s}} = 5 \text{ s}$ <p>حالا سرعت متوسط را به دست می‌آوریم:</p> $v_{av} = \frac{\Delta x_T}{\Delta t_T} = \frac{10 \text{ m} + 20 \text{ m} + 30 \text{ m}}{5 \text{ s} + 5 \text{ s} + 5 \text{ s}} = \frac{60 \text{ m}}{15 \text{ s}} = 4 \text{ m/s}$	تلاشی در مسیر موفقیت

۶	مقدار کمتری را نشان می‌دهد. اگر جهت مثبت را به سمت پایین بگیریم و قانون دوم را برای شخص بنویسیم، داریم:
۷	نادرست. اگر از مقاومت هوا صرف نظر کنیم، هر دو با یک سرعت به زمین برخورد می‌کنند.
۸	(الف) نیروی مقاومت هوا در خلاف جهت حرکت است و نیروی وزن هم همواره به سمت مرکز زمین است.
۹	<p>ب) برای به دست آوردن بزرگی شتاب ابتدا باید اندازه نیروی خالص را حساب کنیم.</p> $m = 0.2 \text{ kg} / g = F \Rightarrow F = W_{\text{end}} = 0.5$ $= (0.5)(0.2) = 0.1$ $\Rightarrow t F_n = (0.5) = 0.1$ $\Rightarrow t F_n = (\sqrt{0 + 5^2}) = 1.3$ <p>حالا می‌توانیم شتاب را حساب کنیم.</p> $a = \frac{t F_n}{m} = \frac{1.3}{0.2} = \frac{13}{2} \text{ m/s}^2$ <p>پ) جهت شتاب همان جهت نیروی خالص است:</p>
۱۰	<p>قانون دوم به صورت $\ddot{a} = \frac{F_n}{m}$ است. با توجه به این موضوع اگر نیرو دو برابر شود، شتاب دو برابر می‌شود. مطابق شکل یک قطعه یخ به جرم 1 kg را که در ابتدا ساکن بوده است، روی سطح بدون اصطکاکی به کمک نیروستنجی با نیروی F می‌کشیم و آن را 1 m جایه‌جا می‌کنیم. با اندازه گیری مدت زمان جایه‌جایی با استفاده از رابطه $\Delta x = \frac{1}{2} a t^2$ شتاب را حساب می‌کنیم. حالا اگر همین کار را با نیروی $2F$ انجام دهیم، می‌بینیم شتاب دو برابر می‌شود. در واقع اگر نیرو را 2 برابر کنیم، شتاب هم 2 برابر می‌شود. پس می‌فهمیم نیرو و شتاب رابطه مستقیم دارند.</p>
۱۱	<p>الف) گام اول: ابتدا شکل ساده‌ای از مسئله رسم می‌کنیم و نیروهایی را که بر جسم وارد می‌شوند نشان می‌دهیم.</p> <p>گام دوم: چون جسم در راستای قائم حرکت نمی‌کند، در حال تعادل است. با توجه به این موضوع قانون دوم نیوتون را برای راستای قائم می‌نویسیم و نیروی عمودی سطح را به دست می‌آوریم:</p> $F_n = 0 \Rightarrow F - W = 0 \Rightarrow F = W$ $= (20)(5) = 100 = 10$ <p>گام سوم: جسم در راستای افقی هم ساکن است؛ پس برای این راستا هم قانون دوم را می‌نویسیم و داریم:</p> $F_n = 0 \Rightarrow F_e = 0 \Rightarrow F_e = F$ $= (20)(5) = 100 = 10$ <p>گام چهارم: حالا اندازه نیروی اصطکاک ایستایی بیشینه را داریم و ضریب اصطکاک ایستایی را می‌خواهیم. با استفاده از رابطه اصطکاک در آستانه حرکت این ضریب را محاسبه می‌کنیم:</p> $\mu_s = \frac{f_{s,\max}}{F} \Rightarrow \mu_s = \frac{10}{100} = 0.1$ $\Rightarrow \mu_s = \frac{24 N}{25 N} = 0.96$

ب) یک شکل جدید برای وقتی که جسم در حال حرکت است رسم می‌کنیم و نیروهای وارد بر جسم را نشان می‌دهیم. در قسمت قبل فهمیدیم است و چون ضریب اصطکاک جنبشی را هم داریم ابتدا نیروی اصطکاک جنبشی را حساب می‌کنیم:



$$f_k = \mu_k \cdot F_N = 0.3 \times (25 \text{ N}) = 7.5 \text{ N}$$

حالا قانون دوم نیوتون را برای راستای افقی می‌نویسیم:

$$\begin{aligned} F_{\text{net},x} &= m a_x \Rightarrow F_e - f_k = m a \Rightarrow F_e - (7.5 \text{ N}) \\ &= (2/5 \text{ kg})(1 \text{ N/kg}) \Rightarrow F_e = (2/5 \text{ N}) + (7.5 \text{ N}) = 10 \text{ N} \end{aligned}$$

و در مرحله آخر تغییر طول فنر را به دست می‌آوریم:

$$\begin{aligned} F_e &= kx \Rightarrow 10 \text{ N} = (200 \text{ N/m})x \Rightarrow x = \frac{10 \text{ N}}{200 \text{ N/m}} \\ &= \frac{1}{20} \text{ m} = 5 \text{ cm} \end{aligned}$$

جنبشی ۱۲

دامنه نصف طول مسیر نوسان است: ۱۳

$$\begin{aligned} A &= \frac{1}{2} = \frac{10 \text{ cm}}{2} = 5 \text{ cm} = 5 \times 10^{-2} \text{ m} \\ x(t) &= A \cos \omega t = A \cos(2\pi ft) = 5 \times 10^{-2} \cos(2\pi \times 5 \times t) \\ \Rightarrow x(t) &= 5 \times 10^{-2} \cos 10\pi t \end{aligned}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{180 \text{ N/m}}{0.2 \text{ kg}}} = \sqrt{900 (1/\text{s}^2)} = 30 \text{ rad/s}$$

امضاء:

نام و نام خانوادگی مصحح: مهدی هاشمی

جمع بارم: ۵۰ نمره

نوبتی بو

تلاشی در مسیر موفقیت

تلشی درس پر مفهیت



- دانلود گام به گام تمام دروس 
- دانلود آزمون های قلم چی و گاج + پاسخنامه 
- دانلود جزوه های آموزشی و شب امتحانی 
- دانلود نمونه سوالات امتحانی 
- مشاوره کنکور 
- فیلم های انگیزشی 

 Www.ToranjBook.Net

 [ToranjBook_Net](https://t.me/ToranjBook_Net)

 [ToranjBook_Net](https://www.instagram.com/ToranjBook_Net)