

تلاش برای درست سپرمه فنی پیش



- دانلود گام به گام تمام دروس 
- دانلود آزمون های قلم چی و گاج + پاسخنامه 
- دانلود جزوه های آموزشی و شب امتحانی 
- دانلود نمونه سوالات امتحانی 
- مشاوره کنکور 
- فیلم های انگیزشی 

ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱	نام و نام خانوادگی:	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان ۲
تعداد صفحه: ۲	عدد امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir			دانش آموزان روزانه سراسرکشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۹

ردیف	استفاده از ماشین حساب ساده دارای چهار عمل اصلی مجاز می‌باشد. (سوالات پاسخ نامه دارد)	نمره
------	--	------


الف) بخش الزامی

دانش آموز عزیز به سوالات ۱ تا ۱۲ (جهت کسب ۱۶ نمره) پاسخ دهید.

۱	درستی یا نادرستی عبارت‌های زیر را مشخص کنید. الف) چند جمله‌ای $P(x) = (x+1)^2(x-2)^3$ یک چند جمله‌ای از درجه ۵ است. ب) اگر تابع f در یک بازه نزولی اکید باشد، در این بازه نزولی نیز هست. پ) مقدار تابع سینوس در $x = \frac{\pi}{3}$ تعریف نشده است. ت) خط $x = 1$ عماس قائم منحنی $f(x) = \sqrt[3]{x}$ است.	۱
۱	در جاهای خالی کلمه یا عبارت مناسب بنویسید. الف) اگر بازه $[1, 2]$ دامنه تابع $f(x)$ باشد، دامنه تابع $(3x+1)f$ برابر است. ب) سرعت لحظه‌ای در $t=9$ برای متحرکی با معادله حرکت $s(t) = \sqrt{t}$ برابر است.	۲
۱	نمودار تابع زیر را به کمک نمودار تابع $y = \cos x$ رسم کنید. $y = \cos 2x - 1$	۳
۱/۵	مقادیر a و b را طوری تعیین کنید که چندجمله‌ای $P(x) = x^5 + ax^3 + bx - 2$ بخش پذیر بوده و باقی مانده تقسیم آن بر $(x+1)^3$ برابر ۳ باشد.	۴
۱	دوره تناب و مقادیر ماکزیمم و مینیمم تابع $y = \cos \frac{1}{3}x - \sqrt{5}$ را محاسبه کنید.	۵
۱/۷۵	معادله مثلثاتی $\cos 3x - \cos x = 0$ را حل کنید.	۶
۱/۵	حدود زیر را محاسبه کنید. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{x+1}{\tan x}$ (الف) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^3+1}{x^3+2x^2+1}$ (ب)	۷
	«ادامه سوالات در صفحه دوم»	

ساعت شروع: ۸ صبح	تاریخ امتحان: ۱۳۹۹/۰۶/۱۱	نام و نام خانوادگی:	سوالات امتحان نهایی درس: حسابان ۲
تعداد صفحه: ۲	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	رشته: ریاضی و فیزیک	پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه
دانش آموزان روزانه سراسر کشور در نوبت شهریور ماه سال ۱۳۹۹ http://aee.medu.ir			

ردیف	استفاده از ماشین حساب ساده دارای چهار عمل اصلی مجاز می باشد. (سوالات پاسخ نامه دارد)	نمره
------	--	------

۱		اگر رفتار تابع $f(x) = \frac{x+3}{x^2+bx+c}$ در اطراف نقطه $-1 = x$ به صورت شکل زیر باشد، عقایدیر c, b را به دست آورید.	۸
۱		نمودار تابع $f(x) = \frac{x+1}{x^2+x}$ در نزدیکی مجانب قائم آن به چه صورتی می باشد؟	۹
۱/۲۵		اگر $f(x) = x^r - 3x$ باشد، با استفاده از تعریف مشتق (f') را حساب کنید.	۱۰
۳	$f(x) = (\sqrt{3x+2})(x^2+1)$ (الف)	مشتق توابع زیر را به دست آورید. (ساده کردن مشتق الزامی نیست) مشتق $g(x) = (x^2+3x+1)^7$ (ب) $h(x) = \frac{x^2-5x+7}{-2x+9}$ (پ)	۱۱
۱		اگر $f(x) = \sin^r x - \cos 2x$ عقدار $(f'')\left(\frac{\pi}{4}\right)$ را حساب کنید	۱۲
	ب) بخش انتخابی دانش آموز عزیز جهت کسب ۴ نمره، از بین سوالات ۱۳ قسمت ۲ سوال را به دلخواه انتخاب و پاسخ دهید.		
۲		محاذن های قائم و افقی نمودار تابع $y = \frac{1+2x^2}{1-x^2}$ را در صورت وجود به دست آورید.	۱۳
۲		مشتق پذیری تابع $f(x) = \begin{cases} x^2 & x \leq 0 \\ x & x > 0 \end{cases}$ را در $x = 0$ بررسی کنید.	۱۴
۲		اکسترمم های مطلق تابع $f(x) = 2x^3 + 3x^2 - 12x$ را در بازه $[-1, 3]$ مشخص کنید.	۱۵
۲		جدول تغییرات و نمودار تابع $f(x) = x^3 - 3x + 1$ را رسم کنید.	۱۶
۲۴	جمع نمره	موفق و سربلند باشید.	

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۳	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱۳۹۹ / ۰۶ / ۱۴		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۹	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱	الف) درست ب) درست پ) نادرست ت) نادرست هر مورد (۰/۲۵) نمره	۱
۲	الف) [۱۰] مشابه کار در کلاس صفحه ۱۰ ب مشابه تمرين صفحه ۲۷ هر مورد (۰/۵) نمره	۱
۳	کار در کلاس صفحه ۱۰ رسم هر نمودار (۰/۵) نمره	۱
۴	مشابه تمرين صفحه ۲۲ $x - 2 = 0 \rightarrow x = 2 \rightarrow p(2) = 0 \rightarrow 4a + 2b = -6 \quad (0/5)$ $x + 1 = 0 \rightarrow x = -1 \rightarrow p(-1) = 3 \rightarrow a - b = 6 \quad (0/5)$ $a = 1 \quad (0/25), \quad b = -5 \quad (0/25)$	۱/۵
۵	مشابه تمرين صفحه ۳۳ $\max = \pi + \sqrt{5} \quad (0/25), \min = -\pi + \sqrt{5} \quad (0/25), \quad T = \frac{\frac{2\pi}{1}}{\frac{1}{2}} = 4\pi \quad (0/5)$	۱
۶	مشابه تمرين صفحه ۴۴ $\cos 3x = \cos x \quad (0/25) \Rightarrow \begin{cases} 3x = 2k\pi + x \\ 3x = 2k\pi - x \end{cases} \quad (0/5) \Rightarrow \begin{cases} 2x = 2k\pi \\ 4x = 2k\pi \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (0/5)$ $\begin{cases} x = k\pi \\ x = \frac{k\pi}{2} \end{cases} \quad (k \in \mathbb{Z}) \quad (0/5)$	۱/۷۵
۷	مثال صفحه ۵۳ تمرين صفحه ۶۹	۱/۵
۸	مشابه تمرين صفحه ۵۸ $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{b}{2} = -1 \Rightarrow b = 2 \quad (0/5)$ $(-1)^r - 2 + c = 0 \Rightarrow c = 1 \quad (0/5)$	۱

با سمه تعالي

مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه	تعداد صفحه: ۳	رشته: ریاضی فیزیک	راهنمای تصحیح درس: حسابان ۲
تاریخ امتحان: ۱ / ۰۶ / ۱۳۹۹		پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه	
مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی http://aee.medu.ir		دانش آموزان روزانه سراسر کشور در شهر یور ماه سال ۱۳۹۹	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۹	$x(x^r + 1) = \cdot \Rightarrow x = \cdot (0 / 25)$ $\lim_{x \rightarrow \infty^+} \frac{x+1}{x^r+x} = +\infty \quad (0 / 25), \lim_{x \rightarrow \infty^-} \frac{x+1}{x^r+x} = -\infty \quad (0 / 25)$ 	۱
۱۰	مثال صفحه ۵۷	
۱۰	$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^r - 3x + 2}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x-2)}{x-1} = -1 \quad (0 / 25)$	۱/۲۵
۱۱	مثال صفحه ۷۹	
۱۱	$f'(x) = \underbrace{\left(\frac{3}{2\sqrt{3x+2}}\right)(x^r + 1)}_{(0 / 25)} + \underbrace{(3x^r)\left(\sqrt{3x+2}\right)}_{(0 / 5)}$ $g'(x) = \underbrace{\sqrt{(2x+3)(x^r + 3x + 1)}}_{(0 / 25)}$ $h'(x) = \underbrace{\frac{(2x-5)(-2x+9) - (-2)(x^r - 5x + 7)}{(-2x+9)^2}}_{(0 / 25)}$	۳
۱۲	تمرین صفحه ۱۰۱	
۱۲	$f'(x) = 2\sin x \cos x + 2\sin 2x = 3\sin 2x \quad (0 / 5)$ $f''(x) = 2\cos 2x \Rightarrow f''\left(\frac{\pi}{6}\right) = 2\cos \frac{\pi}{3} = 2 \quad (0 / 5)$	۱
۱۳	تمرین صفحه ۱۰۱	
۱۳	$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x^r}{-x^r} = -2 \quad (0 / 5) \Rightarrow y = -2 \quad (0 / 5)$ $1-x^r = 0 \quad (0 / 5) \Rightarrow x = \pm 1 \quad (0 / 5)$	۲
۱۴	تمرین صفحه ۶۹	
۱۴	$\lim_{x \rightarrow \circ^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow \circ^-} f(x) = f(\circ) = \circ \quad (0 / 5)$ $f'_-(\circ) = \lim_{x \rightarrow \circ^-} \frac{x^r - \circ}{x - \circ} = \circ \quad (0 / 5) \quad f'_+(\circ) = \lim_{x \rightarrow \circ^+} \frac{x - \circ}{x^r - \circ} = 1 \quad (0 / 5)$ $f'_-(\circ) \neq f'_+(\circ) \quad (0 / 5)$ پس تابع مشتق پذیر نمی باشد	۲

راهنمای تصحیح درس : حسابان ۲	رشته : ریاضی فیزیک	تعداد صفحه : ۳	مدت امتحان: ۱۲۰ دقیقه
پایه دوازدهم دوره دوم متوسطه		تاریخ امتحان: ۱: ۰۶ / ۰۶ / ۱۳۹۹	
دانش آموزان روزانه سراسر کشور در شهریور ماه سال ۱۳۹۹	مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی	http://aee.medu.ir	

ردیف	راهنمای تصحیح	نمره
۱۵	$f'(x) = 6x^2 + 6x - 12 = 0 \quad (0/25)$ $\Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -2 \end{cases} \quad (0/5)$ $f(-1) = 13$ $f(1) = -7 \quad (0/25) \Rightarrow \min: (-1, -7), \max: (1, 45) \quad (0/25)$ $f(3) = 45$ مشابه مثال صفحه ۱۲۳	۲
۱۶	$y' = 3x^2 - 3 \quad (0/25)$ $y'' = 6x \quad \rightarrow x = 0 \rightarrow (0, 1)$ $y' = 0 \rightarrow x = \pm 1$ نقاط عطف (۰/۵) نمره <p>رسم جدول (۰/۵) نمره</p> <p>رسم نمودار (۰/۵) نمره</p> <p>مشابه تمرين صفحه ۱۴۴</p>	۲
۲۴	« همکاران گرامی لطفا به راه حل های صحیح دیگر به تناسب نمره دهید . » جمع نمره	

تلاش برای درست سپرمه فنی پشت



- دانلود گام به گام تمام دروس 
- دانلود آزمون های قلم چی و گاج + پاسخنامه 
- دانلود جزوه های آموزشی و شب امتحانی 
- دانلود نمونه سوالات امتحانی 
- مشاوره کنکور 
- فیلم های انگیزشی 