

تلاشی در سپرمه مفهومی پشت




- دانلود گام به گام تمام دروس 
- دانلود آزمون های قلم چی و گاج + پاسخنامه 
- دانلود جزوه های آموزشی و شب امتحانی 
- دانلود نمونه سوالات امتحانی 
- مشاوره کنکور 
- فیلم های انگیزشی 

 Www.ToranjBook.Net

 ToranjBook_Net


 ToranjBook_Net

درس نامهٔ توب برای شب امتحان




حالا اگر با افزایش مقادیر x مقادیر y زیاد شوند ولی بعضی نقاط نمودار، هم‌عرض باشند، می‌گوییم تابع f صعودی است مانند تابع روبرو:

اگر چنان به کمک تعاریف بالا، می‌توانید تابع اکیداً نزولی و تابع نزولی را خودتان تعریف کنید.




شکل (۱)



شکل (۲)

پس تابع مربوط به شکل (۱) اکیداً نزولی و تابع مربوط به شکل (۲) نزولی است.

تکمیل تنها تابعی که هم صعودی و هم نزولی است، تابع ثابت $y = k$ می‌باشد ($k \in \mathbb{R}$) ضمناً ممکن است تابعی در کل دامنه خود، هم صعودی باشد نه نزولی ولی در بازه‌هایی از دامنه‌اش صعودی و در بازه‌هایی نزولی باشد؛



مانند شکل روبرو؛ این تابع در بازه

هم نزولی، در بازه‌های $[-1, 2]$ و $[2, 6]$

(۱) اکیداً نزولی و در بازه $[2, 6]$

(۲) اکیداً صعودی است.


مثال تابع زیر را رسم کرده و بازه‌هایی که در آن‌ها تابع صعودی، نزولی یا ثابت است را مشخص کنید.
(فراراز ۱۰)

$$y = \frac{1}{x} \quad (\text{الف})$$

$$\begin{cases} x+1 & x < -2 \\ 1 & -2 < x < 1 \\ -2x & x > 1 \end{cases} \quad (\text{ب})$$


$$y = -\frac{1}{x} \quad (\text{ب})$$

$$y = \frac{1}{x} \Rightarrow$$



تابع در بازه‌های $(-\infty, 0)$ و $(0, +\infty)$ اکیداً نزولی است ولی در کل \mathbb{R} ، هم صعودی و نه نزولی است.

$$y = -\frac{1}{x} \Rightarrow$$



تابع در بازه‌های $(-\infty, 0)$ و $(0, +\infty)$ اکیداً صعودی است ولی در کل \mathbb{R} ، هم صعودی و نه نزولی است.

$$\begin{cases} x+1 & x < -2 \\ 1 & -2 < x < 1 \\ -2x & x > 1 \end{cases} \quad (\text{ب})$$

x	-2	-2
y	-1	-2
x	1	2
y	-2	-4

فصل ۱: تابع

درس ۱: توابع چندجمله‌ای - تابع صعودی و نزولی

توابع چندجمله‌ای

هر تابع که ضابطه‌اش به شکل $f(x) = ax^n + bx^{n-1} + \dots + kx + c$ باشد یک تابع چندجمله‌ای از درجه n نام دارد.

n عدد صحیح نامنفی و $a \neq 0$ است. مثلاً تابع

$f(x) = 5x^3 - 8x + 1$ یک تابع چندجمله‌ای از درجه ۳ است.

تابع $f(x) = ax^2 + bx + d$ یک تابع چندجمله‌ای از درجه ۲ است.

است $(a \neq 0)$. البته در کتاب درسی، تابع $y = x^2$ مورد توجه قرار گرفته که نمودار آن به طور تقریبی به شکل روبرو است.

برای نمودار $y = x^2$ دامنه $= \mathbb{R}$ بود.

مثال نمودار تابع $y_1 = (x-2)^3 + 1$ و $y_2 = -x^3 - 2$ را به کمک نمودار $y = x^3$ رسم کنید.

پاسخ برای رسم نمودار y_1 باید نمودار x^3 را ۲ واحد به راست و سپس ۱ واحد به بالا منتقال دهیم که به نمودار روبرو می‌رسیم:

برای رسم نمودار y_2 ابتدا نمودار x^3 را نسبت به محور x از قرینه می‌کنیم سپس آن را ۳ واحد به پایین منتقال می‌دهیم:

مقایسه نمودار $y = x^3$ و $y = x^5$

می‌دانید که اگر x هر عددی بین صفر و یک باشد، حاصل x^5 بزرگ‌تر از x^3 است پس در بازه $(0, +\infty)$ نمودار x^5 بالاتر از x^3 است ولی در بقیه x ‌های مثبت، نمودار x^5 بالاتر از x^3 است.

در x ‌های منفی هم که واضح است مقدار x^5 مثبت و مقدار x^3 منفی است پس نمودار x^5 بالاتر است.

در تابع f اگر با افزایش مقادیر x مقادیر y هم مرتب افزایش یابند، می‌گوییم f اکیداً صعودی است مانند تابع روبرو:

۴) به دست اوردن (x) با داشتن $(f(x))$ و $(g(x))$

در این صورت فرض می‌کنیم که $f(x) = g(x)$ ، سپس از این رابطه x را برحسب t پیدا کرده و در رابطه fog که به ماداده شده قرار می‌دهیم، درنهایت t را به x تبدیل می‌کنیم
حالا اگر $f(x) = 2x^2 - 7x$ و $g(x) = 2x - 6$ باشد، آن‌گاه تابع $f(x)$ را به دست آورید.

$$(fog)(x) = f(g(x)) \Rightarrow f(2x - 6) = 2x^2 - 7x$$


$$2x - 6 = t \Rightarrow 2x = t + 6 \Rightarrow x = \frac{t+6}{2}$$

$$\text{در تابع بالا} \rightarrow f(t) = 2\left(\frac{t+6}{2}\right)^2 - 7\left(\frac{t+6}{2}\right)$$

$$\xrightarrow{\text{تبديل}} f(x) = 2\left(\frac{x+6}{2}\right)^2 - 7\left(\frac{x+6}{2}\right)$$


۵) انتقال و تبدیل نمودارها

نمودار تابع f را به صورت مقابل فرض کنید:




برای رسم نمودار $y = f(x \pm k)$ ، ریشه داخل پرانتز را به دست می‌آوریم و با توجه به علامت آن نمودار f را به چپ یا راست حرکت می‌دهیم؛ مثلاً برای رسم $y = f(x+2)$ خواهیم داشت:

$$x+2=0 \Rightarrow x=-2 \text{ واحد به چپ حرکت می‌دهیم.} \Rightarrow$$




همراهان تکاور

برای رسم نمودار $y = f(x) \pm k$ نمودار f را با توجه به علامت $\pm k$ به بالا یا پایین منتقل می‌کنیم، ضمناً جهت حرکت موافق علامت این عدد می‌باشد یعنی اگر این عدد مثبت باشد به بالا و اگر منفی بود به پایین حرکت می‌کنیم مثلاً برای رسم $y = f(x)+2$ با توجه به نمودار اولیه f کافی است نمودار f را ۲ واحد به بالا حرکت دهیم:




برای رسم $y = f(-x)$ کافی است نمودار f را نسبت به محور لاملاً قرینه کنیم (انعکاس دهیم):



برای رسم $y = -f(x)$ کافی است در نمودار f طول

نقطه را بر k تقسیم کنیم، پس فقط دامنه تابع تغییر می‌کند و بجز بدون تغییر خواهد بود. مثلاً برای رسم $y = f(2x)$ طول نقاط نمودار f را بر ۲ تقسیم می‌کنیم (نمودار فشرده‌تر می‌شود). بهطور کلی اگر $|k| > 1$ باشد نمودار به صورت افقی فشرده‌تر و اگر $|k| < 1$ باشد نمودار به صورت افقی کشیده‌تر می‌شود.



پس تابع f در بازه $(-2, -1)$ (اکیداً صعودی)، در بازه $(-1, 1)$ (ثابت هم صعودی، هم نزولی) و در بازه $(1, 1)$ (اکیدا نزولی است).

۶) درس آن: ترکیب توابع

اگر f و g دو تابع با دامنه‌های D_g و D_f باشند، ترکیب تابع f و g را به نمادهای fog و gof نمایش می‌دهیم و خواهیم نوشت:

$$y = (fog)(x) = f(g(x)) , D_{fog} = \{x \in D_g \mid g(x) \in D_f\}$$

$$y = (gof)(x) = g(f(x)) , D_{gof} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

اگر $f = \{(1, 2), (-2, 1), (5, 4)\}$ و $g = \{(1, 3), (-2, 2), (5, 9)\}$ باشد، f را تشکیل دهید.

$$\begin{array}{ccc} 1 & \xrightarrow{f} & 2 \\ -2 & \xrightarrow{f} & 1 \\ 5 & \xrightarrow{f} & 4 \end{array} \Rightarrow fog = \{(1, 4), (-2, 1)\}$$

دققت کنید 9 در دامنه f نیست!

ضمناً با توجه به جواب به دست آمده برای fog می‌توان گفت:

$$(fog)(1) = 4 , (fog)(-2) = 1$$

هذا تابع f معرفی شد. اولاً دامنه تابع f و g را تعیین کنید. ثالثاً $(gof)(-2)$ را محاسبه کنید.

$$\text{تعیین دامنه: } f(x) = \sqrt{4-x^2} \Rightarrow 4-x^2 \geq 0$$

$$\Rightarrow x^2 \leq 4 \Rightarrow -2 \leq x \leq 2$$

$$g(x) = \frac{x+2}{x-1} \xrightarrow{\text{تعیین دامنه}} x-1=0 \Rightarrow x=1 \Rightarrow D_g = \mathbb{R} - \{1\}$$

$$D_{gof} = \{x \in D_f \mid f(x) \in D_g\}$$

$$= \{x \in [-2, 2] \mid \frac{\sqrt{4-x^2}}{\sqrt{4-x^2}-1} \in \mathbb{R} - \{1\} \xrightarrow{\text{معنی}} x \neq \pm \sqrt{2}\} = [-2, 2] - \{\pm \sqrt{2}\}$$

$$\text{نایاب: } (gof)(x) = g(f(x)) = \frac{\sqrt{4-x^2} + 2}{\sqrt{4-x^2} - 1}$$

$$\text{ثالثاً: } (\frac{gof}{f-g})(-) = \frac{(gof)(-)}{f(-)-g(-)} = \frac{\frac{g(f(-))}{\sqrt{4-(-)^2}-1}}{2-(-)} = \frac{-1}{4} = -\frac{1}{4}$$

۷) به دست اوردن (x) با داشتن $(f(x))$ و $(g(x))$

ايندا گل تابع g را در تابع f به جای x قرار می‌دهیم تا fog به دست آيد. سپس جواب آن را با fog که در فرض به ماداده شده مساوی قرار می‌دهیم تا g به دست آيد.


هذا fog باشد، ضابطه تابع $g(x)$ را باید.

$$\text{اعمال: } f(x) = \frac{1}{1+x}, (fog)(x) = \frac{g(x)}{1+g(x)}$$

$$\Rightarrow xg(x) = 1+g(x) \Rightarrow \frac{xg(x)-g(x)}{g(x)} = 1$$

$$\Rightarrow g(x)(x-1) = 1 \Rightarrow g(x) = \frac{1}{x-1}$$


برای رسم $y = kf(x)$ کافی است در نمودار $y = f(x)$ عرض نقاط را در عدد k ضرب کنیم. پس فقط برد تابع تغییر می‌کند. ضمناً اگر $|k| > 1$ باشد، نمودار به صورت عمودی کشیده‌تر و اگر $|k| < 1$ باشد، نمودار به صورت عمودی فشرده‌تر می‌شود. مثلاً نمودار $y = 2f(x)$ را رسم می‌کنیم، حال به عنوان تمرین، خودتان نمودار $y = -2f(x-2) + 3$ را رسم کنید.



به کمک قواعد انتقال و تبدیل، نمودار تابع زیر را رسم کنید:

$$y = -2|x-1| + 2 \quad (\text{الف})$$




$$y = 2\cos\frac{x}{2} \quad (\text{ب})$$



عرض نقاط ۲ برابر و سپس نمودار نسبت به محور x فربینه می‌شود.



۲ واحد به سمت بالا




رسم نمودار f

برای رسم نمودار $y = |f(x)|$ ، کافی است ابتدا نمودار $(x, f(x))$ را رسم کنیم سپس قسمت‌هایی از نمودار را که زیر محور x ها قرار دارند نسبت به محور x فربینه می‌کنیم.

مثال ۴ نمودار تابع $y = |x^2 - 4|$ را رسم کنید.


پاسخ ابتدا نمودار $y = x^2$ را رسم کرده سپس قسمت پایین محور x را نسبت به این محور فربینه می‌کنیم.



درس ۳: تابع وارون

تابع یک به یک

هرگاه تابع f به صورت مجموعه‌ای از زوج مرتب‌ها داده شود، این تابع وقتی یک به یک است که هیچ دو زوج مرتب متمایزی، عضو دوم مساوی نداشته باشند. از نظر هندسی، نمودار یک تابع وقتی یک به یک است که هر خط افقی دلخواه، نمودار را در بیش از یک نقطه قطع نکند. مثلاً تابع (۱) یک به یک نیست ولی تابع (۲) یک به یک است.



از نظر ضابطه، تابع f یک به یک است هرگاه:

$$\text{اگر } x_1, x_2 \in D_f, f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow x_1 = x_2$$

البته تأکید کتاب درسی، روش رسم نمودار است.

(۱) ثابت کنید $\frac{x-1}{x}$ یک به یک است.

مثال ۵ ثابت کنید $f(x) = \frac{x-1}{x}$ یک به یک است.

$$f(x_1) = f(x_2) \Rightarrow \frac{x_1-1}{x_1} = \frac{x_2-1}{x_2}$$

$$\text{طرفین وسطین} \rightarrow x_1 x_2 - x_1 = x_2 x_1 - x_1 \Rightarrow x_1 = x_2 \Rightarrow$$

یک به یک است.

محدود کردن دامنه برای یک به یک شدن تابع

گاهی اوقات تابعی مانند f در دامنه‌اش یک به یک نیست ولی اگر دامنه‌اش را محدود کنیم، یک به یک می‌شود به عنوان مثال تابع $y = |x-2|$ در دامنه‌اش معنی $f(x) = |x-2|$ دارد (که این دامنه $[2, +\infty)$ است). این تابع یک به یک خواهد شد (البته در هر زیرمجموعه‌ای از این دو بازه هم، f یک به یک است). این را هم بدانید که در سهی $y = ax^2 + bx + c$ اگر دامنه را به صورت $\left[-\frac{b}{2a}, +\infty\right]$ محدود کنیم، تابع یک به یک خواهد شد.

$$y = |x-2|$$

$$D_f = \mathbb{R}$$

(یک به یک نیست.)

$$y = |x-2|$$

$$D_f = [2, +\infty)$$

(یک به یک است.)

$$y = |x-2|$$

$$D_f = (-\infty, 2]$$

(یک به یک است.)

مثال ۶ یک به یک بودن یا نبودن تابع $y = x^2 - 2x + 3$ را بررسی کنید. اگر f

یک به یک نبود، دامنه آن را طوری محدود کنید که یک به یک شود.

مثال: تحقیق کنید توابع $f(x) = \frac{1}{x-2}$ و $g(x) = \frac{1}{x}$ وارون یکدیگرند.

(الف) برای کدام مقادیر x داریم: $f(g(x)) = x$:

(ب) برای کدام مقادیر x داریم: $g(f(x)) = x$:

لمسه: اگر حاصل fog و gof هر دو برابر x شوند به این معناست که f و g وارون یکدیگرند.

$$\left\{ \begin{array}{l} (fog)(x) = f(g(x)) = f\left(\frac{1}{x-2}\right) = \frac{1}{\frac{1}{x-2}} + 2 = x - 2 + 2 = x \\ (gof)(x) = g(f(x)) = g\left(\frac{1}{x} + 2\right) = \frac{1}{\frac{1}{x} + 2 - 2} = \frac{1}{x} = x \end{array} \right.$$

$\Rightarrow f$ و g وارون یکدیگرند.

$$(fog)(x) = x \Rightarrow x \in D_g \Rightarrow x \in \mathbb{R} - \{2\} \quad (\text{الف})$$

$$(gof)(x) = x \Rightarrow x \in D_f \Rightarrow x \in \mathbb{R} - \{1\} \quad (\text{ب})$$

مثال: اگر 2 و $g(x) = x + 2$ و $f(x) = 4x - 3$ باشند، با محاسبه نشان دهید که:

$$(gof)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$$

لمسه: اگر gof را y بنامیم، خواهیم داشت:

$$y = (gof)(x) = g(f(x)) = g(4x - 3) = 4x - 3 + 2 = 4x - 1$$

$$\Rightarrow y = 4x - 1 \Rightarrow 4x = y + 1 \Rightarrow x = \frac{y+1}{4}$$

↑
اسهارا عوض می کنیم

$$y = \frac{y+1}{4}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} y = f(x) = 4x - 3 \Rightarrow 4x = y + 3 \Rightarrow x = \frac{y+3}{4} \Rightarrow f^{-1} = \frac{y+3}{4} \\ y = g(x) = x + 2 \Rightarrow x = y - 2 \Rightarrow g^{-1} = x - 2 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow f^{-1} \circ g^{-1} = \frac{(x-2)+3}{4} = \frac{x+1}{4} = (gof)^{-1}$$

فصل ۲: مثلثات

۱ درس انتاوب و تابع انتاوب

تابع انتاوب


تابع f را در صورتی متابوب می گوییم که عددی مثبت مانند T وجود داشته باشد به طوری که برای هر $x \in D_f$ دو شرط زیر را داشته باشیم:

گوچکترین عدد مثبت T را دوره تابع f می نامیم. مثلاً دوره تابع تابع

$f(x) = \sin x$ برابر 2π است، زیرا دو شرط بالا دارد یعنی اولاً دوره تابع برابر

است پس $\sin(x \pm 2\pi) = \sin x$ است و ضمناً $\sin(x \pm 2\pi) \in D_f$ می باشد. پس

نودار تابع $\sin x$ در هر بازه به طول 2π عیناً تکرار می شود:



لمسه: در توابع $y = a \cos bx + c$ و $y = a \sin bx + c$ مقدار ماکریسم برابر

$|a| + c$ و مقدار میسمیم برابر $-|a| + c$ و دوره تابع برابر $\frac{2\pi}{|b|} = T$ می باشد. ضمناً

همواره داریم: C . مثلاً در تابع $y = -3 \cos 2x + 1$ $y = -3 \cos 2x + 1 = -3 + 1 = -2$

$$\max = |-2| + 1 = 4 \quad \min = -|-2| + 1 = -2 + 1 = -1$$

$$T = \frac{2\pi}{|b|} = \frac{2\pi}{|2|} = \pi$$

درس نامه

لمسه: بهتر است نمودار تابع را رسم کنیم و از روی آن، وضعیت یکبهیکی تابع را بررسی کنیم:

$$y = x^2 - 2x + 3 \rightarrow y = (x-1)^2 + 2 \Rightarrow S \boxed{1}$$

پس تابع f در \mathbb{R} یکبهیک نیست ولی در بازه های $[1, +\infty)$ یا $(-\infty, 1]$ بازه های یک بهیک خواهد بود.

تابع وارون (معکوس)

اگر در تابع f جای x و y ها را با هم عوض کنیم وارون f به دست می آید.

مثال آنکه $f = \{(1, 2), (2, 4), (5, 6)\}$ باشد. آن گاه $f^{-1} = \{(2, 1), (4, 2), (6, 5)\}$ می باشد.

هم جنین اگر $f = \{(2, y), (1, 9), (3, 7)\}$ باشد. آن گاه $f^{-1} = \{(y, 2), (9, 1), (7, 3)\}$ خواهد بود. ولی اگر دقت کنید واضح است که f^{-1} خودش یک تابع است و f^{-1} تابع نیست (دو زوج مرتب مختلف، عوشهای اولشان مساوی است). علت این است که f یکبهیک بود و f^{-1} خودش یک نبود. در اینجا اصطلاحاً می گوییم f وارون یزدیر (معکوس یزدیر) است. یعنی f^{-1} خودش، یک تابع است حال با توجه به شکل داریم:

$$\Rightarrow \begin{cases} D_f = [1, +\infty) \Rightarrow R_{f^{-1}} = [1, +\infty) \\ R_f = [1, +\infty) \Rightarrow D_{f^{-1}} = [1, +\infty) \end{cases}$$

تابع مهم این بحث

۱ تابع f وقتی وارون یزدیر است که یکبهیک باشد.
۲ دامنه f باشد f^{-1} و برد f با دامنه f^{-1} برابر است.

۳ نمودارهای f و f^{-1} نسبت به خط $x = y$ (یعنی ربع اول و سوم) قرینه هستند.


$$A(2, 2) \in f \Rightarrow A'(2, 2) \in f^{-1}$$

نافتن ضابطه f^{-1}

برای این کار ابتدا x را برحسب y به دست می آوریم و سپس نام x را به $y = f^{-1}(x)$ و نام y را به x تغییر می دهیم البته جوستان باشد اول باید بررسی کنید که آیا یکبهیک است یا خیر.

مثال: وارون یزدیری تابع $f(x) = (x+5)^2$ را با شرط $-5 \leq x \leq 0$ بررسی کرده سپس ضابطه تابع وارون را در صورت وجود به دست آورید.

لمسه: با رسم نمودار تابع، متوجه می شویم که تابع f با دامنه $-5 \leq x \leq 0$ یکبهیک است:



$$y = (x+5)^2 \Rightarrow x+5 = \sqrt{y}$$

بافتنت تابع وارون $\Rightarrow x = \sqrt{y} - 5$

لمسه: ترکیب هر تابع با تابع وارون خود برابر x می شود:

$$(fof^{-1})(x) = x, x \in D_{f^{-1}}$$

$$(f^{-1}of)(x) = x, x \in D_f$$

$$(fof^{-1})(x) \neq (f^{-1}of)(x)$$

پس در حالت کلی:

درس ۲: معادلات مثلثاتی

نسبت‌های مثلثاتی زوایای دوبرابر کمان (۲۰)

برای محاسبه $\cos 2\alpha$ و $\sin 2\alpha$ به کمک نسبت‌های مثلثاتی زاویه α ، به صورت زیر عمل می‌کنیم:

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha \quad \begin{array}{l} \text{اگر در متن سوال} \\ \text{دیدید از فرمول زیر استفاده کنید.} \end{array}$$

$$\sin \alpha \cos \alpha = \frac{1}{2} \sin 2\alpha$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha$$

مثال: مقادیر $\sin 15^\circ$ و $\cos 15^\circ$ را حساب کنید.

پاسخ: 15° را فرض می‌کنیم و از فرمول‌های بالا استفاده می‌کنیم:

$$\cos 2\alpha = 1 - 2 \sin^2 \alpha \Rightarrow \cos 2(15^\circ) = 1 - 2 \sin^2 15^\circ$$

$$\Rightarrow \cos 30^\circ = 1 - 2 \sin^2 15^\circ \Rightarrow \frac{\sqrt{3}}{2} = 1 - 2 \sin^2 15^\circ$$

$$\Rightarrow 2 \sin^2 15^\circ = 1 - \frac{\sqrt{3}}{2} \Rightarrow 2 \sin^2 15^\circ = \frac{2 - \sqrt{3}}{2}$$

$$\Rightarrow \sin^2 15^\circ = \frac{2 - \sqrt{3}}{4} \quad \begin{array}{l} \text{جذر} \\ \text{ضمناً از سال‌های قبل می‌دانیم که} \end{array} \cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha \quad \text{لذا:}$$

$$\cos^2 15^\circ = 1 - \sin^2 15^\circ = 1 - \frac{2 - \sqrt{3}}{4} = \frac{4 - 2 + \sqrt{3}}{4} = \frac{2 + \sqrt{3}}{4}$$

$$\rightarrow \cos 15^\circ = \sqrt{\frac{2 + \sqrt{3}}{4}} = \frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}$$

$$\tan 15^\circ = \frac{\sin 15^\circ}{\cos 15^\circ} = \frac{\frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{2}}{\frac{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}{2}} = \frac{\sqrt{2 - \sqrt{3}}}{\sqrt{2 + \sqrt{3}}}$$

مثال: اگر α زوایای حاده و $\sin \alpha = \frac{3}{5}$ باشد، حاصل $\cos 2\alpha$ و $\sin 2\alpha$ را به دست آورید.

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha \quad \begin{array}{l} \sin \alpha = \frac{3}{5} \\ \rightarrow \cos^2 \alpha = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \end{array}$$

$$\rightarrow \cos \alpha = \pm \frac{4}{5} \quad \begin{array}{l} \text{حاقداً است} \\ \alpha \end{array} \rightarrow \cos \alpha = \frac{4}{5}$$

$$\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha = 2 \left(\frac{3}{5}\right) \left(\frac{4}{5}\right) = \frac{24}{25}$$

$$\cos 2\alpha = \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \frac{16}{25} - \frac{9}{25} = \frac{7}{25}$$

معادلات مثلثاتی

برای حل معادلات مثلثاتی، ابتدا به کمک فرمول‌ها و اتحادهای مثلثاتی، تعداد نسبت‌های مثلثاتی را کاهش می‌دهیم تا در طرف معادله، سینوس یا دو طرف معادله کسینوس باشند سپس خواهیم داشت:

$$\sin x = \sin \alpha \Rightarrow \begin{cases} x = 2k\pi + \alpha \\ x = 2k\pi + \pi - \alpha \end{cases}$$

$$\cos x = \cos \alpha \Rightarrow x = 2k\pi \pm \alpha$$

به جواب‌های بالا جواب‌های کلی (عمومی) می‌گوییم ولی اگر جواب‌های خاصی مدنظر باشد به اعداد صحیح را نسبت می‌دهیم تا x هایی که در یک بازه خاص هستند به دست آیند. حالتهای خاص معادلات سینوسی و کسینوسی هم عبارتند از:

$$\sin x = 1 \Rightarrow x = 2k\pi + \frac{\pi}{2}$$

$$\sin x = -1 \Rightarrow x = 2k\pi - \frac{\pi}{2}$$


$$\sin x = 0 \Rightarrow x = k\pi$$

$$\cos x = 1 \Rightarrow x = 2k\pi$$

$$\cos x = -1 \Rightarrow x = 2k\pi + \pi$$

$$\cos x = 0 \Rightarrow x = k\pi + \frac{\pi}{2}$$

مثال: نمودار زیر مربوط به تابع $f(x) = a \cos bx + c$ است. مقادیر a , b و c را به دست آورید.



$$\begin{cases} \max = 2 \\ \min = -2 \end{cases} \Rightarrow c = \frac{\max + \min}{2} = \frac{2 + (-2)}{2} = 0$$

$$\max = |a| + c \Rightarrow 2 = |a| + 0 \Rightarrow |a| = 2 \Rightarrow a = \pm 2$$

ولی با توجه به شکل، چون $f(0) = -2$ می‌باشد فقط -2 قابل قبول است. همچنین با توجه به شکل، دوره تناوب برابر 2π است، لذا:

$$T = \frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow 2\pi = \frac{2\pi}{|b|} \Rightarrow |b| = 1 \Rightarrow b = \pm 1$$

تازه‌اند

محور T' در شکل مقابل، محور تازه‌اند ها نام دارد. برای باقتن مقادیر تازه‌اند زوایه‌ای مثل α ، پاره خط OM را امتداد می‌دهیم تا محور T' قطع کند اندازه N نقطه‌ای مثل N همان $\tan \alpha$ می‌باشد. $\tan \alpha$ همان AN می‌باشد (نقطه A مبدأ تازه‌اند است).

اگر $\tan \alpha = \frac{\pi}{2}$ باشد، $\tan \alpha$ تعریف نشده است چون اگر پاره خط OM را امتداد دهیم.

محور T' را قطع نمی‌کند؛ پس $\tan \frac{\pi}{2}$ تعریف نشده است.

با توجه به توضیحات بالا تابع $y = \tan x$ به صورت رو به رو قابل رسم می‌باشد. ضمناً تابع $y = \tan x$ متناوب است و دوره تناوب آن $T = \pi$ است، همچنین دامنه و برد تازه‌اند به صورت زیر است:

$$D_y = \{x \in \mathbb{R} \mid x \neq k\pi + \frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\}, R_y = \mathbb{R}$$

مثال: تابع $y = \tan x$ در بازه $[0, 2\pi]$ صعودی است یا نزولی؟

پاسخ: با توجه به نموداری که رسم کردیم واضح است که تابع در بازه‌های $(0, \frac{\pi}{2})$ و $(\frac{\pi}{2}, 2\pi)$ اکیداً صعودی است ولی در

کل بازه $[0, 2\pi]$ غیریکنوا است (نه صعودی است، نه نزولی)، چون مثلاً در نزدیکی $x = \frac{\pi}{2}$ شاخه سمت چپ به $+\infty$ و شاخه سمت راست به

$-\infty$ می‌رود. (به دو طرف $x = \frac{\pi}{2}$ در شکل توجه کنید). یعنی از $+\infty$ ناگهان به $-\infty$ می‌رود.

تغییرات $\tan x$ در ۴ ناحیه دایره مثلثاتی

در هر ربع دایره مثلثاتی، با زیاد شدن مقدار زوایه، \tan آن زوایه هم زیاد می‌شود پس در هر ربع یاری، $\tan x$ اکیداً صعودی است. توجه کنید اگر گفته شود: $y = \tan x$ در بازه $(0, \pi)$ صعودی است یا نزولی؟، می‌گوییم نه صعودی است، نه نزولی؛ چون بازه $(0, \pi)$ شامل دو ناحیه مختلف می‌باشد.

در محاسبه حدی نهایت اگر L عددی مثبت باشد دقت کنید که:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} L = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} L = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} -L = -\infty, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} -L = +\infty$$

و اگر L عددی منفی باشد، خواهیم داشت:

مثال: حاصل حد های زیر را به دست آورید:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{|x| - 1}{|4x - 1|}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 6}{\sin x}$$

لمسه: اگر $\frac{1}{4}$ را در مخرج به جای x قرار دهیم حاصل مخرج، صفر می شود ولی جون $(1 - 4x)$ داخل قدر مطلق است باید بتویسیم.

$$\left[\frac{1}{4} \right] - 1 = \frac{-1}{4} = \frac{-1}{4} = -\infty = \text{حد موردنظر}$$


ب) اگر در مخرج به جای x صفر بگذاریم به \sin^+ می رسمیم ولی می دانیم که:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 6}{\sin x} = \frac{2(+\infty) + 6}{\sin^+} = \frac{+\infty}{+} = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 6}{\sin x} = \frac{2(-\infty) + 6}{\sin^-} = \frac{-\infty}{-} = -\infty$$

درس ۲: حد در بی نهایت

حد در بی نهایت



وقتی $x \rightarrow +\infty$, آن‌گاه عرض نقاط تابع به عدد 3 نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند لذا می‌توان چنین نوشت: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 3$

وقتی $x \rightarrow -\infty$, آن‌گاه عرض نقاط تابع به عدد -3 نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند، پس خواهیم نوشت: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -3$

ضمناً توجه کنید که وقتی $x \rightarrow \pm\infty$, آن‌گاه برای حدگرفتن از یک چندجمله‌ای خواهیم داشت:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} (ax^n + bx^{n-1} + \dots + k) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} ax^n$$

یعنی جمله باتوان بیشتر برای متغیر را انتخاب می‌کنیم. ضمناً توجه کنید که:

$\infty \times \infty = \infty$ $\infty + \infty = \infty$	$\frac{\infty}{\infty} = \infty$ $\frac{\infty \times \infty}{\infty} = \infty$
---	--

مثال: حاصل حد های زیر را به دست آورید.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x - 4 + 7x^2)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 - 2x + 1}{5x^2 + 10x - 6}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{x^2 + 2x - 4}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-10x^4 - 7x^2}{2x^5 - 3}$$

لمسه: $= \lim_{x \rightarrow -\infty} (7x^2) = 7(-\infty)^2 = 7 \times \infty = +\infty$ حد موردنظر (الف)

$$= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2}{5x^2} = \frac{4}{5} \text{ حد موردنظر (ب)}$$

$$\lim_{x \rightarrow A} \frac{x^2 - Ax}{\sqrt{x-2}}$$

مثال: حد مقابل را به دست آورید.

لمسه: الان اگر عدد A را در کسر جای گذاری کنیم به $\frac{A^2 - A^2}{\sqrt{A-2}} = 0$ می‌رسیم. پس $(x - A)$ عامل صفرشونده است، از طرفی فرجه رادیکال 3 است پس باید از اتحاد جاق و لاغر استفاده کنیم:

$$\text{حد} = \lim_{x \rightarrow A} \frac{x^2 - Ax}{\sqrt{x-2}} \times \frac{\sqrt{x^2} + 2\sqrt{x} + 4}{\sqrt{x^2} + 2\sqrt{x} + 4}$$

$$= \lim_{x \rightarrow A} \frac{x(x - A)(\sqrt{x^2} + 2\sqrt{x} + 4)}{x - A}$$

$$= A(\sqrt{A^2} + 2\sqrt{A} + 4) = A(4 + 2(2) + 4) = A \times 12 = 96$$

مفهوم همسایگی

هر بازه باز مثل (a, b) شامل عدد حقیقی k را یک همسایگی k می‌نامیم؛ مثلاً می‌توان گفت بازه $(1, 4)$ یک همسایگی عدد 3 است.

همچنین به هر بازه به شکل $(k, k+b)$ یک همسایگی راست k می‌گوییم ($a > 0$) یک همسایگی چپ k می‌گوییم ($a < 0$)؛ مثلاً بازه $(3, 4)$ یک همسایگی راست 3 و بازه $(2, 3)$ یک همسایگی چپ 3 است.

حالا اگر خود عدد k را از همسایگی حذف کنیم به بازه $\{k\}$ یک همسایگی محدود 3 است، البته یک عدد، می‌نهایت همسایگی محدود دارد.

کاربرد همسایگی یک عدد و همسایگی محدود یک عدد در مبحث حد است. مثلاً وقتی می‌نویسیم $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 4$ ، تابع f باید در همسایگی محدود 3 تعریف شده باشد. مثلاً در شکل مقابل حد تابع f در $x = 3$ موجود و برابر با 4 است:


$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3} f(x) = 4$$

ولی حد تابع g در $x = 3$ موجود نیست و فقط حد راست دارد، چون g فقط در همسایگی راست 3 تعریف شده است:


$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 3^+} g(x) = 4$$

حدی نهایت (نامتناهی)

اگر جواب یک حد در یک نقطه برابر $+\infty$ یا $-\infty$ شود اصطلاحاً می‌گوییم حد در آن نقطه وجود ندارد چون جواب حد، باید عددی متناهی شود. به شکل‌های زیر توجه کنید:



$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = +\infty$$



$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = -\infty$$

$$f'(1) = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^7 - 7x - (-7)}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)}{x-1} = 1-7=-6$$

از طرفی عرض نقطه نمایش برابر است با $f'(1) = -6$ لذا به کمک شبیه یعنی عدد -6 و نقطه $(1, -2)$ معادله خط مماس را می‌نویسیم:

$$y - y_1 = m(x - x_1) \Rightarrow y - (-2) = -6(x - 1)$$

$$\Rightarrow y = -6x + 6 - 2 \Rightarrow y = -6x + 4$$

درس ۲: مشتق پذیری و پیوستگی

یک قضیه بسیار مهم در ریاضی می‌گوید که اگر تابع f در $x = a$ مشتق پذیر باشد، آن‌گاه f در $x = a$ قطعاً پیوسته هم می‌باشد. چون اثبات این قضیه ممکن است در امتحان مطرح شود لذا آن را حتماً بپریرید.

لطفاً باید نشان دهیم که:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

$$\text{می‌دانیم } f \text{ در } a \text{ مشتق پذیر است، پس } f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \text{ وجود دارد؛ لذا}$$

$$\lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \times \left(\frac{f(x) - f(a)}{x - a} \right)$$

$$= \lim_{x \rightarrow a} (x - a) \times f'(a) = 0 \times f'(a) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} (f(x) - f(a)) = 0$$

$$\Rightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$$

نتیجه قضیه مذکور این است که: اگر f در $x = a$ پیوسته نباشد، آن‌گاه f در $x = a$ مشتق پذیر نمی‌باشد.

مشتق چپ و راست

با توجه به مفهوم مشتق که در ابتدای فصل گفتیم، می‌توان چنین نوشت که:

$$f'_+(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} : \text{مشتق راست در } a$$

$$\text{یا } f'_+(a) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$a : f'_-(a) = \lim_{x \rightarrow a^-} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} : \text{مشتق چپ در } a$$

$$\text{یا } f'_-(a) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

نتیجه تابع f وقتی در $x = a$ مشتق پذیر است که اولاً در $x = a$ پیوسته باشد و $f'_+(a) = f'_-(a)$.

مثال مشتق پذیری تابع $f(x) = |1-x^7|$ را در نقطه $x = 1$ بررسی کنید.

لطفاً اولاً در $x = 1$ پیوسته است، زیرا:

ناتایاً مشتق‌های چپ و راست در $x = 1$ را بررسی می‌کنیم:

$$f'_-(1) = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{|1-x^7| - 0}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1-x^7}{x-1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(1-x)(1+x+x^2+\dots+x^6)}{x-1} = -(1+1) = -2$$

$$f'_+(1) = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{|1-x^7| - 0}{x - 1}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-(1-x^7)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{-(1-x)(1+x+x^2+\dots+x^6)}{x-1} = 1+1=2$$

چون $f'_-(1) \neq f'_+(1)$ ، لذا f در $x = 1$ مشتق پذیر نیست.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\tau x}{x^7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\tau}{x^6} = \frac{\tau}{(-\infty)^6} = \frac{\tau}{\infty} = 0$$

$$\text{حد موردنظر (ت) } = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-1 \cdot x^5}{x^7} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-\delta x^5}{x^7} = -\delta(-\infty)^5 = -\delta(\infty)^5 = -\delta \infty = +\infty$$

مثال نمودار تابع f را رسم کرده و حدود خواسته شده را به کمک آن به دست آورید:

$$f(x) = \begin{cases} 2 & x > 0 \\ -2 & x < 0 \end{cases} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = ? \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = ?$$



$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$$

مثال با توجه به شکل مقابل، حاصل حد های خواسته شده را به دست آورید.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = ?, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = ?$$

وقتی $x \rightarrow +\infty$ شاخه سمت راست نمودار به سمت پایین یعنی $-\infty$ حرکت می‌کند همچنان وقتی $x \rightarrow -\infty$ شاخه سمت چپ نمودار به سمت بالا یعنی $+\infty$ حرکت می‌کند، لذا:

فصل ۳: مشتق

درس ۱: آشنایی با مفهوم مشتق

تعريف مشتق

مشتق تابع f در نقطه‌ای به طول $x = a$ به دو شکل زیر تعریف می‌شود:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} : \text{متغیر است. (h)}$$

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} : \text{متغیر است. (x)}$$

البته $f'(a)$ فقط وقتی تعریف شده است که حاصل حد های بالا موجود و متناهی شود. یعنی به طور مثال اگر برای $f'(a)$ دو جواب مختلف به دست آمد یا حاصل $f'(a)$ برابر ∞ شود، مشتق f در a تعریف نشده است.

خط مماس بر منحنی

$f'(a)$ بیانگر شبیه خط مماس بر منحنی در $x = a$ است.


مثال معادله خط مماس بر منحنی تابع $f(x) = x^7 - 2x$ را در نقطه $x = 1$ واقع بر منحنی به دست آورید.

لطفاً ابتدا باید شبیه خط مماس که همان مشتق در $x = 1$ است را محاسبه کنیم. ما برای آموختن از هر دو فرمول بالا استفاده می‌کنیم، شما در امتحان از هر فرمول که راحت‌ترید استفاده کنید:

$$f'(1) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h) - f(1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^7 - 2(1+h) - (-2)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1+7h+7h^2+7h^3+7h^4+7h^5+7h^6-2-2h+2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^7-h}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h(h^6-1)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} h^6-1 = 1-1 = 0$$



اگر $f'(x)$ باشد، آن‌گاه تابع مشتق f در x را با $f'(x)$ تغایش داده و خواهیم داشت:

$$f'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

بنته حد بالا باید موجود و متناهی باشد. x ای از D_f که به ازای آنها f' موجود باشد را $D_{f'}$ (دامنه مشتق) می‌نامیم.

مثال: تابع مشتق تابع $f(x) = \sqrt{x}$ را به همراه دامنه آن به دست آورید.

$$\begin{aligned} f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+h} - \sqrt{x}}{h} \times \frac{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{x+h-x}{h(\sqrt{x+h} + \sqrt{x})} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{\sqrt{x+h} + \sqrt{x}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{x}} = \frac{1}{2\sqrt{x}} \end{aligned}$$

پس تابع مشتق برابر است با: $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ و دامنه f' برابر است با $(0, +\infty)$.

فرمول‌های محاسبه مشتق (بدون استفاده از تعریف)

در فرمول‌های زیر k عددی حقیقی و n عددی طبیعی می‌باشد:

۱) $y = k \Rightarrow y' = 0$

۲) $y = \sqrt{x} \Rightarrow y'(x) = 0$

۳) $y = kx \Rightarrow y' = k$

۴) $y = -rx \Rightarrow y' = -r$

۵) $y = \frac{x}{a} \Rightarrow y' = \frac{1}{a}$

۶) $y = x^n \Rightarrow y' = nx^{n-1}$

۷) $y = x^k \Rightarrow y' = kx^k$

۸) $y = kf(x) \Rightarrow y' = kf'(x)$

۹) $y = v \cdot x^k \Rightarrow y' = v \cdot (kx^k) = v \cdot x^k$

مثال: به کمک تعریف مشتق (مفهوم مشتق)، بررسی کنید که آیا تابع

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & x \neq 2 \\ 1 & x = 2 \end{cases}$$

مشتق چپ: مشتق راست:



$$f'_-(2) = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x^2 - 1}{x - 2} = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

$$f'_+(2) = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x^2 - 1}{x - 2} = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

چون مشتق‌های چپ و راست، موجود و متناهی نیستند، لذا f در $x = 2$ مشتق‌پذیر نیست.

بررسی مشتق‌پذیری تابع از روی نمودار آن

از نظر نموداری، هر جا تابع نایپوسته باشد (نقطه توخالی داشته باشیم یا نمودار یکتاریجه نباشد) تابع مشتق‌پذیر نیست. ضمناً در هر نقطه‌ای که بتوان ۲ خط مماس بر نمودار تابع رسم کرد تابع مشتق‌پذیر نیست (نقطه نوک تیز یا گوشایی در نمودارها) و در نهایت این که هر جا خط مماس مماس بر نمودار، موازی محور z باشد مشتق وجود ندارد (چون شب خط موازی با محور z برابر ∞ است و گفتیم که شیب مماس همان مشتق است).




مثال: با رسم نمودار تابع زیر، مشخص کنید در چه نقاطی مشتق‌پذیر نیستند؟

الف) $f(x) = |x| - 1$

ب) $y = \begin{cases} x^2 + 1 & x \leq 0 \\ -x^2 + 1 & x > 0 \end{cases}$

ج) $y = -|x| + |x-1|$

د) $y = |1-x^2|$



الف) نمودار تابع در نقاط به طول $x = 1$ و $x = -1$ نوک تیز است (دو خط مماس دارند) لذا f در این نقاط مشتق‌پذیر نیست.

مشتق تابع مرکب (قاعده زنجیری)

اگر f و g دو تابع مشتق پذیر باشند، در این صورت تابع مرکب $f \circ g$ نیز مشتق پذیر است و خواهیم داشت:

$$y = (f \circ g)(x) = f(g(x)) \Rightarrow y' = g'(x) \times f'(g(x))$$

یا می‌توان دستور بالا را به صورت زیر نوشت:

$$y = f(u) \Rightarrow y' = u' \times f'(u)$$

$$\text{منل} \quad \frac{1}{\sqrt{x}} \times f'(\sqrt{x}) \quad \text{برابر است با: } f(\sqrt{x})$$

اگر $f(x) = f(x^r + \Delta x)$ باشد، آن‌گاه $f'(1) = \Delta$ و $g(x) = f(x^r + \Delta x)$ را به دست آورید.

$$g(x) = f(\underbrace{x^r + \Delta x}_u)$$

پاسخ

$$\text{منل} \quad g'(x) = (\Delta x + \Delta) \times f'(x^r + \Delta x)$$

$$\xrightarrow{x=1} g'(1) = (\Delta(1) + \Delta) f'(1^r + \Delta(1)) \Rightarrow g'(1) = \Delta f'(1)$$

$$\Rightarrow \Delta = \Delta f'(1) \Rightarrow f'(1) = \frac{\Delta}{\Delta}$$

مشتق پذیری روی یک بازه

تابع f روی بازه (a, b) مشتق پذیر است.

هرگاه در هر نقطه از این بازه مشتق پذیر باشد، ضمناً f روی بازه $[a, b]$ مشتق پذیر

است هرگاه روی بازه (a, b) مشتق پذیر باشد و در نقطه $x = a$ مشتق راست و

در نقطه $x = b$ مشتق چپ داشته باشد.

در نمودار زیر، مشتق پذیری f را روی چند

بازه بروصی می‌کنیم:

f در بازه $[-4, 1]$ مشتق پذیر است.

f در بازه $(-4, 5)$ مشتق ناپذیر است.

چون در $x = 3$ مشتق ندارد (نقطه گوشی یا زاویده‌دار است).

f روی بازه $(5, +\infty)$ مشتق پذیر است.

f در بازه $(4, 6)$ مشتق ناپذیر است، چون در $x = 5$ ناپیوسته است.

درس ۳: آهنگ تغییر


آهنگ لحظه‌ای و آهنگ متوسط تابع

منظور از آهنگ یا سرعت لحظه‌ای تابع f در نقطه a همان $f'(a)$ می‌باشد همچنان

$$\frac{f(b) - f(a)}{b - a} \quad \text{کسر} \quad a \text{ تا } b$$

از نظر هندسی، آهنگ (سرعت) لحظه‌ای f در $x = a$ همان شیب خط مماس بر نمودار

f در a است و آهنگ (سرعت) متوسط f از a تا b شیب خطی است که دو نقطه ابتدایی و انتهایی را به هم وصل می‌کند.



$$\text{منل} \quad y = \sqrt{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\text{منل} \quad y = \sqrt{ax + b} \Rightarrow y' = \frac{a}{2\sqrt{ax + b}}$$

$$\text{منل} \quad y = \sqrt{rx - s} \Rightarrow y' = \frac{r}{2\sqrt{rx - s}}$$

$$\text{منل} \quad y = \sqrt[3]{x} \Rightarrow y' = \frac{1}{3\sqrt[3]{x^2}}$$

$$\text{منل} \quad y = (f \pm g)(x) \Rightarrow y' = f'(x) \pm g'(x)$$

$$\text{منل} \quad y = ax^r - bx^s + \sqrt{cx + d} \Rightarrow y' = rx^{r-1} - sx^{s-1} + \frac{c}{2\sqrt{cx + d}}$$

$$\text{منل} \quad y = (f \cdot g)(x) \Rightarrow y' = f'(x)g(x) + f(x)g'(x)$$

$$\text{منل} \quad y = \frac{(rx^s + t)(-x^u + \frac{1}{x})}{u} \quad \text{منل}$$

$$\Rightarrow y' = \frac{(-rx^s + \frac{1}{x})(-x^u + \frac{1}{x}) + (-rx - \frac{1}{x^2})(rx^s + t)}{x^u}$$

$$\text{منل} \quad y = \frac{x^r - rx}{rx + \sqrt{x}} \quad \text{منل}$$

$$\text{منل} \quad y' = \frac{\frac{r}{(rx^r - r)}(rx + \sqrt{x}) - (r + \frac{1}{2\sqrt{x}})(x^r - rx)}{(rx + \sqrt{x})^2} \quad \text{منل}$$

$$\text{منل} \quad y = f^n(x) \Rightarrow y' = n \times \frac{f'(x)}{f} \times f^{n-1}(x) \quad \text{منل}$$

$$\text{منل} \quad y = (1 \cdot x^r - dx^r - r)^{1/n}$$

$$\Rightarrow y' = r \times (1 \cdot x^r - dx^r - r) \times (1 \cdot x^r - dx^r - r)^{1/n}$$

$$\text{منل} \quad y = \left(\frac{-rx + r}{x^r - 1} \right)^{1/n}$$

$$\Rightarrow y' = 1/n \times \frac{(-rx^r + r) - rx(-rx + r)}{(x^r - 1)^2} \times \left(\frac{-rx + r}{x^r - 1} \right)^{1/n}$$


$$\text{منل} \quad y = (rx^s - rx)^t (\sqrt{x}) \quad \text{منل}$$

$$\Rightarrow y' = t \cdot \frac{(rx^s - rx)^{t-1} \cdot (rx^s - rx) \cdot (\sqrt{x})}{rx^s - rx} + \text{منل}$$

$$\text{منل} \quad \frac{1}{2\sqrt{x}} \times \frac{(rx^s - rx)^s}{rx^s - rx} \quad \text{منل}$$

و هم مینیمم نسبی محاسبه شوند. ضمناً نقاط ابتدا و انتهایی یک بازه اکسترم نسبی محاسبه نمی‌شوند (چون تابع فقط در یک طرف آنها وجود دارد). حال اگر عرض در کل دامنه تابع بزرگ‌تر یا مساوی (کوچک‌تر یا مساوی) عرض سایر نقاط باشد

به A ماقزیمم مطلق (مینیمم مطلق) می‌گوییم.



مثال: در شکل مقابل، اکسترم‌های نسبی و مطلق را مشخص کنید.

$$\begin{cases} B, D, F, G, (H, G) & \Rightarrow \text{نقاطین نسبی} \\ C, E, (H, G) & \Rightarrow \text{نقاطین نسبی} \\ F & \Rightarrow \text{(از همه بالاتر است). ماقزیمم مطلق} \\ A & \Rightarrow \text{(از همه پایین تر است). مینیمم مطلق} \end{cases}$$

پاسخ:

تابع f با دامنه $[a, b]$ را در نظر بگیرید. نقاطی از بازه (a, b) که مشتق f' در آنها صفر است یا مشتق f' در آنها وجود ندارد (مانند نقطه نایپوستگی) نقاط بحرانی f نامیده می‌شوند. به ۲ موضوع مهم توجه کنید که اولاً طول نقطه بحرانی باید متعلق به دامنه تابع باشد و ثانیاً تابع در یک همسایگی نقطه بحرانی باید تعريف شده باشد. در امتحان، برای پافتان نقاط بحرانی، از تابع مشتق بگیرید و مسلوی صفر قرار دهید (اگر مشتق، کسری شد نخرج را هم مساوی صفر قرار دهید). حال برای پافتان \min و \max مطلق، عرض نقاط بحرانی و عرض نقاط ابتدا و انتهایی دامنه را به دست می‌آوریم. بیشترین عرض، ماقزیمم مطلق و کمترین عرض، مینیمم مطلق خواهد بود.

مثال: اکسترم‌های مطلق تابع زیر را پیدا کنید.

$$f(x) = x^7 - 27x^5 - 4 \quad x \in [-4, -1] \quad (\text{الف})$$

$$y = x^5 - 12x^3 \quad (\text{ب})$$

$$f(x) = x^7 - 27x^5 - 4 \quad x \in [-4, -1] \quad (\text{الف})$$

$$y' = 0 \Rightarrow 7x^6 - 27 = 0 \Rightarrow x^6 = 9$$

$$\Rightarrow x = \pm\sqrt[6]{9} \quad \text{فقط ۶ در} \quad \Rightarrow x = -\sqrt[6]{9} \quad \text{بهرانی} -3 \quad \text{در} \quad \text{دامنه فارغ‌دارد.}$$

نقطه به طول -4 و -1 $x = -1$ ابتدا و انتهایی بازه بسته هستند، این نقاط بحرانی نیستند ولی عرض آنها را نیز باید حساب کنیم.

x	-4	-2	-1
y	۴۰	۵۰	۲۲
max			
مطلق			

$$y = x^5 - 12x^3 \Rightarrow y' = \frac{6}{5}x^4 - 12x^2 = \frac{6}{5}x^2(x^2 - 20)$$

$$= \frac{6}{5}x^{\frac{1}{5}} - \frac{12}{5}x^{\frac{3}{5}} = \frac{6\sqrt[5]{x}}{5} - \frac{12}{5}\sqrt[5]{x^3}$$

$$\begin{aligned} 6x - 12 &= 0 \Rightarrow x = 2 \quad \text{رسانه صورت ۲} \\ \text{در تابع } y &= 2^5 - 12 \times 2^3 = \sqrt[5]{2^6} - 12\sqrt[5]{2} \\ &= 2\sqrt[5]{2} - 12\sqrt[5]{2} = -10\sqrt[5]{2} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^6 &= 0 \Rightarrow y = 0 \quad \text{رسانه مخرج ۰} \\ \text{بس } 2 &-1 \quad \text{مینیمم مطلق و صفر ماقزیمم مطلق خواهد بود.} \end{aligned}$$

مثال: گلوله‌ای را در راستای عمودی به بالا پرتاب می‌کنیم. معادله حرکت آن به صورت $y = -5t^7 + 1 \cdot t + 0 = -5t^7 + t + 0$ می‌باشد. (۱) زمان پر حساب ثانیه و ارتفاع از سطح زمین بر حسب متغیر است. (۲) زمان قرار دارد؟ (ارتفاع آن صفر است).

(الف) این گلوله در چه لحظه‌هایی در زمین قرار دارد؟ (ارتفاع آن صفر است).

(ب) معادله سرعت این گلوله را بنویسید. سرعت در شروع حرکت و در لحظه برخورد با زمین چقدر است؟

(ج) ارتفاع ماقزیمم این گلوله از لحظه ۱ تا پایان حرکت چقدر است؟

پاسخ:

$$y = 0 \Rightarrow -5t^7 + t + 0 = 0 \Rightarrow t(-5t^6 + 1) = 0$$

ارتفاع

$$\Rightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 1 \end{cases}$$

شروع حرکت
پایان حرکت (لحظه برخورد با زمین)

$$y = -5t^7 + t + 0 \Rightarrow y' = -10t^6 + 1 = 0$$

سرعت لحظه‌ای در شروع حرکت

$$y'(1) = -10(1)^6 + 1 = -9$$

$$y' = 0 \Rightarrow -10t^6 + 1 = 0 \Rightarrow t = 1$$

(ثانیه)

$$y = -5t^7 + t + 0 \xrightarrow{t=1} y = -5(1)^7 + 1 + 0 = 5$$

(متر)

$$y(b) - y(a) = \frac{y(1) - y(0)}{1 - 0} = \frac{-5 - 0}{1} = -5$$

سرعت متوسط

پاسخ:

فصل ۵: کاربرد مشتق

درس ۱: اکسترم‌های تابع

نکنایی تابع و ارتباط آن با مشتق

در یک بازه از دامنه A ، اگر مقدار f' موجود و مثبت باشد آن گاه f در آن بازه اکیداً صعودی است. اگر f' موجود و منفی باشد آن گاه f در آن بازه اکیداً نزولی است و در نهایت این که اگر f' در یک بازه موجود و برای صفر باشد آن گاه f در آن بازه، تابعی ثابت است.

مثال: تابع $f(x) = x^7 - 2x^5 - 4$ در چه بازه‌هایی اکیداً صعودی و در گدام بازه‌ها اکیداً نزولی است؟

پاسخ: f' را به دست اورده و آن را تعیین علامت می‌کنیم:

$$f'(x) = 7x^6 - 20x^4 = 0 \Rightarrow x^4 = 1 \Rightarrow x = \pm 1$$

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
f'	+	+	-	+
f	$-\infty$	۱	۲	$+\infty$

پس f در بازه $(-\infty, -1)$ اکیداً نزولی و در بازه‌های $(-1, 1)$ و $(1, +\infty)$ اکیداً صعودی است.

اکسترم‌های نسبی و مطلق

به نقطه A در شکل‌های

می‌گوییم چون عرض A بزرگ‌تر یا مساوی عرض نقاط اطراف خود (همسایگی A) است.

منظور از نقاط همسایگی A ، نقاطی در دو طرف A هستند که بسیار به A نزدیک‌اند. به

نقطه B در شکل‌های

مینیمم نسبی می‌گوییم

چون عرض B کوچک‌تر یا مساوی عرض نقاط همسایگی خود است. به نقاط ماقزیمم و مینیمم نسبی، اکسترم نسبی هم می‌گوییم. نقاط روی یک پاره خط افقی، هم ماقزیمم

۴ آزمون مشتق اول برای پیدا کردن ماکزیمم و مینیمم نسبی

برای پیدا کردن اکسترمم های نسبی، ابتدا نقاط بحرانی را به دست آورده و به کمک آن ها، تابع مشتق را تعیین علامت می کنیم هر جا که مشتق از منفی به مثبت تغییر علامت دهد، مینیمم نسبی و هر جا که مشتق از مثبت به منفی تغییر علامت دهد، ماکزیمم نسبی خواهد بود.

مثال: اکسترمم های نسبی و مطلق تابع $y = \frac{1}{3}x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 6x + 10$ را تعیین کنید.

$$y' = 0 \Rightarrow x^2 - 5x + 6 = 0$$

$$\text{طول نقاط بحرانی} \rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 3 \end{cases}$$

x	-∞	2	3	+∞
y'	+	0	-	+
y	-∞ ↗	↗	↘ -∞	

پس $\frac{29}{3}B(2, 3)$ مینیمم نسبی و $\frac{44}{3}A(2, 2)$ ماکزیمم نسبی خواهد بود.

این تابع اکسترمم محلق ندارد، زیرا در بین عرض های موجود در جدول، بیشترین عرض $+∞$ و کمترین عرض $-∞$ است و می دانیم $-∞$ در ریاضی دو نماد هستند و عدد محاسب نمی شوند. ضمناً تابع در بازه $[2, 3]$ نزولی و در بازه های $(-\infty, 2)$ و $(3, +\infty)$ صعودی است. (هر جا مشتق مثبت باشد، تابع صعودی و هر جا منفی باشد، تابع نزولی است).

۵ تعیین پارامترهای مجھول در مسائل اکسترمم نسبی

گاهی اوقات نقطه اکسترمم نسبی به ما داده می شود و محاسبه مجھولاتی مثل a و b از ما خواسته می شود. در این گونه سوالات، یک بار مختصات نقطه داده شده را در خود تابع قرار می دهیم و یک بار هم طول نقطه داده شده را در رابطه $y' = 0$ جای گذاری می کنیم.

مثال: فضای ثابت a و b را طوری تعیین کنید که تابع $f(x) = x^2 + ax^2 + b$

در $A(2, 2)$ یک ماکزیمم یا مینیمم نسبی داشته باشد.

$$y = x^2 + ax^2 + b \xrightarrow{(x=2)} 2^2 + a(2)^2 + b$$

$$\Rightarrow 4a + b = -5$$

$$y' = 0 \Rightarrow 2x^2 + 2ax = 0 \xrightarrow{(x=2)} 2(2)^2 + 2a(2) = 0$$

$$\Rightarrow a = -3 \xrightarrow{\substack{\text{در رابطه} \\ \text{بالا قرار می دهیم}}} b = 7$$

اگر تابع f در نقطه به طول a ماکزیمم یا مینیمم نسبی داشته باشد و $f'(a) = 0$ موجود باشد، آن گاه قطعاً $f''(a) = 0$ است. به عبارت دیگر، هر نقطه اکسترمم نسبی تابع f ، یک نقطه بحرانی هم می باشد.

لذکر: عکس قضیه فرما، لزوماً درست نیست، یعنی هر نقطه بحرانی، لزوماً اکسترمم نسبی نیست. مانند:

اگر در نقطه a خط مماس صفر است (خط مماس افقی) است و این این در نقطه a، اکسترمم نسبی نیست.

مثال: تابع $f(x) = -x^2 + 4x + 2$ را در نظر بگیرید و درستی قضیه فرما را به کمک مشتق، نشان دهید.

پاسخ: ابتدا معادله $f'(x) = 0$ را حل می کنیم تا طول نقطه یا نقاط بحرانی به دست آید:

$$f'(x) = 0 \Rightarrow -2x + 4 = 0 \Rightarrow x = 2$$


x	-∞	2	+∞
y'	+	0	-
y	-∞ ↗	↗	↘ -∞

واضح است که نقطه A(2, 7) اکسترمم نسبی (ماکزیمم نسبی) تابع است. از طرفی نقطه به طول $x = 2$ نقطه بحرانی هم می باشد؛ لذا درستی قضیه فرما، ثابت شده است.

درس ۳: بهینه سازی

در این قسمت می خواهیم به کمک تعیین نقطه یا نقاط بحرانی و تعیین علامت مشتق، مقدار یک یا دو متغیر را طوری تعیین کنیم که مقدار متغیر سوم، ماکزیمم یا مینیمم شود. در این گونه مسائل، عبارت اصلی که می خواهیم ماکزیمم یا مینیمم شود فقط باید شامل یک متغیر باشد ولی اگر دارای ۲ متغیر بود به کمک اطلاعات مسئله، آنها را به یک متغیر تبدیل می کنیم سپس معادله $= 0$ را حل می کنیم تا نقطه یا نقاط بحرانی به دست آیند و در نهایت λ را تعیین علامت می کنیم.

مثال: ورق فلزی مربع شکلی به طول ضلع ۴ cm را در نظر بگیرید. مطابق شکل می خواهیم از چهار گوشة آن، مربع های کوچکی به ضلع x برش بزنیم و آنها را کنار چگاریم. سپس با تاکردن ورق در امتداد خطچین های مستخصل شده در شکل، یک جعبه در بازار سازیم. مقدار x چه قدر باشد تا حجم جعبه، حداقل مقدار ممکن شود؟



می خواهیم حجم مکعب مستطیل، ماکزیمم شود؛ لذا فرمول حجم آن را می نویسیم:

$$V = L \times L \times x = xL^2 \quad (\text{ارتفاع} \times \text{عرض} \times \text{طول})$$

ولی رابطه اخیر دو متغیر دارد لذا باید کاری کنیم که فقط یک متغیر داشته باشد:

$$x + L + x = 4 \Rightarrow 2x + L = 4$$

$$\Rightarrow L = 4 - 2x$$

$$V = xL^2 \xrightarrow{L=4-2x} V = x(4-2x)^2 = x(16 - 16x + 4x^2)$$

$$= 4x^3 - 16x^2 + 16x, \quad x \in [0, 2]$$

چون تابع V تابعی پیوسته است لذا طبق قضیه مقدار اکسترمم، در هر بازه بسته ای هم دارای ماکزیمم است و هم مینیمم. حالا نقاط بحرانی آن را به دست می آوریم:

$$V' = 0 \Rightarrow 12x^2 - 32x + 16 = 0$$

$$\xrightarrow{+2} 2x^2 - 8x + 4 = 0 \xrightarrow{\text{نجزه}} (x-2)(2x-2) = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = \frac{2}{2} \end{cases}$$

نقطه بحرانی

حالا جدول تغییرات تابع V را رسم می کنیم:

x	0	$\frac{2}{2}$	2
V'	+	0	-
V	↗	↗	↘

پس به ازای $\frac{2}{2} = x$ حجم جعبه ماکزیمم می شود (لزومی ندارد مقدار حجم به ازای

$\frac{2}{2} = x$ را به دست آوریم، اگر حجم ماکزیمم خواسته می شد باید $\frac{2}{2} = x$ را در تابع

حجم (تابع V) قرار می دادیم).

فصل ۶: هندسه

درس ۱: تفکر تجسمی و آشنایی با ماقاطع مخروطی

دوران حول محور

وقتی شکل‌های هندسی را حول یک محور دوران دهیم شکل‌های دو بعدی یا سه بعدی ساخته می‌شوند. به قسمت‌های زیر توجه کنید:

■ شکل حاصل از دوران یک مستطیل حول طول یا عرض آن، یک استوانه است.

■ شکل حاصل از دوران یک پاره خط، حول پاره خط دیگری که بر آن عمود است، یک دایره است.

■ شکل حاصل از دوران یک مثلث قائم‌الزاویه، حول یکی از اضلاع قائم، یک مخروط می‌باشد.

■ شکل حاصل از دوران یک دایره، حول یکی از قطرهای آن، یک کره است.

■ شکل حاصل از دوران یک نیم‌دایره، حول شعاع عمود بر قطر آن، یک نیم‌کره است.


■ مساحت مقطعی به ابعاد ۵ و ۳ را حول عرضش دوران می‌دهیم. حجم جسم حاصل را به دست آورید.

پاس: طبق شکل رویدرو، یک استوانه حاصل می‌شود که شعاع قاعده‌اش برابر ۵ و ارتفاعش برابر ۳ است:

$$V = \pi r^2 h = \pi \times 5^2 \times 3 = 75\pi$$


■ عرض مستطیل = ارتفاع استوانه
■ طول مستطیل = شعاع قاعده

من خواهیم اجسام سه بعدی را ترسیم، شکلی که از برخورد یک صفحه با یک جسم هندسی حاصل می‌شود سطح مقطع آن نامیده می‌شود. سطح مقطع حاصل از برخورد یک صفحه با یک مکعب توخالی به شکل‌های زیر است:



آشنایی با ماقاطع مخروطی

دو خط d و ℓ در نقطه‌ای مثل A متقاطع‌اند. اگر خط d را حول خط ℓ دوران کامل دهیم شکل حاصل، یک سطح مخروطی نامیده می‌شود. ضمناً به خط ℓ محور، به نقطه A رأس و به خط d مولد این سطح مخروطی می‌گوییم.



مثال در یک بیضی $b = 5$ و $c = 3$ می‌باشند. اندازه قطر بزرگ، قطر کوچک و فاصله کانونی و هم‌چنین خروج از مرکز بیضی را به دست آورید.

پیش ابتدا باید مقدار a را به دست آورید:

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow a^2 = 25 + 9 \Rightarrow a^2 = 34 \Rightarrow a = \sqrt{34}$$


$$\text{قطر بزرگ} = 2a = 2\sqrt{34}$$

$$\text{قطر کوچک} = 2b = 2 \times 5 = 10$$


$$\frac{c}{a} = \frac{3}{5} = \frac{\sqrt{34}}{5}$$

$$\text{فاصله کانونی} = 2c = 2 \times 3 = 6$$


بیضی قائم: بهتر است برای حل مسائل بیضی، فقط اسکلت اصلی آن را رسم کنیم و نقاط مheim بیضی را روی آن نمایش دهیم. در بیضی قائم طول نقاط O , A' , F , F' , O , B , O , B' هم با هم برابرند.



بیضی افقی: در بیضی افقی نقاط O , B , O , B' و A' , F , F' ، O هم عرض‌اند و نقاط A , F , F' ، O هم طول‌اند.



مثال در یک بیضی $A(2, 5)$ یکی از رئوس اصلی و $F(2, 1)$ یکی از کانون‌ها و $O(2, 1)$ مرکز بیضی می‌باشد. مختصات نقطه رأس‌ها و کانون F' و خروج از مرکز را بایابید.




$$(a = 5 - 1 = 4) \xrightarrow{a^2 = b^2 + c^2} 16 = b^2 + 1 \Rightarrow b^2 = 15 \Rightarrow b = \sqrt{15}$$


$$e = \frac{c}{a} = \frac{1}{4}, B \begin{cases} \alpha + b = 2 + \sqrt{15} \\ \beta = 1 \end{cases}$$

$$B' \begin{cases} \alpha - b = 2 - \sqrt{15} \\ \beta = 1 \end{cases}$$


وقتی یک سطح مخروطی توسط یک صفحه برش زده می‌شود معمولاً سطح مقطع حاصل، یک منحنی است. ولی از آنجا که این منحنی‌ها حاصل برخورد یک صفحه با یک سطح مخروطی هستند، آن‌ها را مقاطع مخروطی می‌نامند.




اگر صفحه P بر محور سطح مخروطی عمود باشد و از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل بیضی خواهد بود.



اگر صفحه P بر محور سطح مخروطی عمود باشد و از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل دایره است.




اگر صفحه P در یکی از موقعیت‌های مولد سطح مخروطی موازی باشد و از رأس آن در قسمت بالایی و هم در قسمت پایینی قطع کند و از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل یک **سهمی** است.



اگر صفحه P در یکی از موقعیت‌های مولد سطح مخروطی راس آن در قسمت بالایی و هم در قسمت پایینی قطع کند و از رأس آن عبور نکند، شکل حاصل را **هذلولی** می‌نامیم.

بیضی شامل تمام نقاطی از صفحه مانند M است که مجموع فاصله‌های آن‌ها از دو نقطه رأس F و F' (کانون‌ها) برابر با مقدار ثابت $2a$ می‌باشد. (جا به جای F و F' همه نیست).



$$\Rightarrow MF + MF' = 2a$$

ضمناً به A و A' رأس‌های کانونی و به B و B' رأس‌های ناکانونی می‌گوییم. اگر نقطه M خارج بیضی باشد:

$$MF + MF' > 2a$$

و اگر داخل بیضی باشد:

$$MF + MF' < 2a$$

و $OA = a \Rightarrow AA' = 2a$

$OB = b \Rightarrow BB' = 2b$

$OF = c \Rightarrow FF' = 2c$

فاصله کانونی:

$O(\alpha, \beta)$: مرکز بیضی

$a^2 = b^2 + c^2$: رابطه بین پارامترهای بیضی

$$c = \frac{c}{a} = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$$

دقت کنید که خروج از مرکز بیضی همواره عددی بین صفر و یک است. هر چه قدر c به ۱ نزدیک‌تر باشد، بیضی کشیده‌تر است و هر چه قدر c به صفر نزدیک‌تر باشد، بیضی به دایره شبیه‌تر است.

مثال مقدار k را چنان تعیین کنید که معادله $x^2 + y^2 - 2x - 6y + k = 0$ دایره‌ای به شعاع ۲ را مشخص کند.

$$r = 2 \Rightarrow \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 - 4c} = 2 \Rightarrow \frac{1}{2}\sqrt{4 + 36 - 4k} = 2$$

$$\sqrt{40 - 4k} = 4 \Rightarrow 40 - 4k = 16 \Rightarrow k = 6$$

وضعیت نقطه نسبت به دایره به شکل‌های استاندارد و گسترده دایره توجه کنید:
 $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2$

شکل استاندارد
کل عبارت را ≥ 0 می‌نامیم.

شکل گسترده
کل عبارت را ≤ 0 می‌نامیم.

حالا مختصات نقطه داده شده را در تابع آ به جای x و y قرار می‌دهیم. اگر حاصل مثبت شد نقطه، خارج دایره، اگر منفی شد نقطه، درون دایره و اگر صفر شد، نقطه روی دایره است.

مثال وضعیت نقاط $(x - 1)^2 + y^2 = 5$ را نسبت به دایره $B(0, -2)$ ، $A(1, 4)$ بررسی کنید.

پاسخ ابتدا تابع آ را تشکیل می‌دهیم (فقط کافی است d را به سمت چپ ببریم). حاصل، مثبت شد پس A خارج دایره است.

$$f = (x - 1)^2 + y^2 - 5 \quad \begin{array}{l} A \\ \uparrow \rightarrow y \end{array} \rightarrow f = (1 - 1)^2 + 4^2 - 5 = 11$$



$$f = (x - 1)^2 + y^2 - 5 \quad \begin{array}{l} B \\ \downarrow \rightarrow x \\ \uparrow \rightarrow y \end{array} \rightarrow f = (-1)^2 + (-2)^2 - 5 = 1 + 4 - 5 = 0$$

حاصل، صفر شد پس نقطه B روی محیط دایره است.

وضعیت خط نسبت به دایره

برای بررسی وضعیت هر خط نسبت به یک دایره ابتدا فاصله مرکز دایره تا آن خط را بدست می‌آوریم و آن را d می‌نامیم سپس d را با شعاع دایره مقایسه می‌کنیم. ضمناً توجه دارید که فاصله نقطه $A(x_1, y_1)$ تا خط $ax + by + c = 0$ برابر است با:

$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$



توجه کنید که خط مماس بر دایره، در نقطه تماس بر شعاع دایره عمود است.

مثال وضعیت خط $x + y = 1$ را نسبت به دایره $x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$ مشخص کنید.

مثال مختصات دو سر قطر بزرگ در یک بیضی $A(-1, 2)$ و $A'(9, 2)$ می‌باشد. اگر فاصله کانونی بیضی ۶ باشد، مختصات دو سر قطر کوچک و کانون‌ها را به دست آورید.

پاسخ عرض نقاط A و A' یکسان است، پس بیضی افقی است. از طرفی نقطه O یعنی مرکز بیضی، وسط پاره خط AA' قرار دارد لذا:

$$O \left[\begin{array}{l} \frac{-1 - 9}{2} = 4 \\ \frac{2 + 2}{2} = 2 \end{array} \right]$$

$$AA' = 9 - (-1) = 10 \Rightarrow 2a = 10 \Rightarrow a = 5$$

فاصله کانونی $= 2c = 6 \Rightarrow c = 3$

$$a^2 = b^2 + c^2 \Rightarrow 25 = b^2 + 9 \Rightarrow b^2 = 16 \Rightarrow b = 4$$

$$F \left[\begin{array}{l} \alpha + c = 4 + 3 = 7 \\ \beta = 2 \end{array} \right], F' \left[\begin{array}{l} \alpha - c = 4 - 3 = 1 \\ \beta = 2 \end{array} \right]$$

$$B \left[\begin{array}{l} \alpha = 4 \\ \beta + b = 2 + 4 = 6 \end{array} \right], B' \left[\begin{array}{l} \alpha = 4 \\ \beta - b = 2 - 4 = -2 \end{array} \right]$$

درس ۳: دایره

دایره و معادله آن

دایره، مجموعه نقاطی از صفحه است که فاصله آن‌ها از نقطه ثابتی در همان صفحه، مقداری ثابت و مثبت باشد. این نقطه ثابت را مرکز دایره و مقدار ثابت را شعاع دایره می‌نامیم.

معادله استاندارد دایره
اگر $O(\alpha, \beta)$ مرکز دایره و r شعاع آن باشد، شکل استاندارد معادله دایره به صورت $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2$ می‌باشد.

مثالاً معادله دایره‌ای به مرکز $O(-1, 4)$ و به شعاع ۳ برابر است با:
 $(x + 1)^2 + (y - 4)^2 = 9$

معادله دایره‌ای را بنویسید که از نقطه $A(1, 2)$ گذشته و نقطه $O(2, 3)$ مرکز آن باشد.

پاسخ شعاع دایره به ما داده نشده و ما باید خودمان آن را به دست آوریم:
 $OA = \sqrt{(2 - 1)^2 + (3 - 2)^2} = \sqrt{4 + 1} = \sqrt{5} = r$

معادله دایره:
 $(x - \alpha)^2 + (y - \beta)^2 = r^2 \Rightarrow (x - 1)^2 + (y - 2)^2 = 5$

معادله گسترده دایره
شکل گسترده معادله دایره به صورت:

$x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$ می‌باشد در این حالت، شعاع دایره به صورت $r = \frac{1}{2}\sqrt{a^2 + b^2 - 4c}$ و مرکز آن

است. توجه کنید فقط اگر $a^2 + b^2 - 4c > 0$ باشد یک دایره

تشکیل خواهد شد. مثلاً در دایرة $x^2 + y^2 - 2x + 4y + 1 = 0$ خواهیم داشت:

$$O \left| \begin{array}{l} \frac{-a}{2} = \frac{-(-2)}{2} = 1 \\ \frac{-b}{2} = \frac{-4}{2} = -2 \end{array} \right.$$

$$r = \frac{1}{2}\sqrt{(-2)^2 + 4^2 - 4(1)} = \frac{1}{2}\sqrt{4 + 16 - 4} = \frac{1}{2}\sqrt{16} = 2$$

شعاع:

درس نامه

فصل ۷: احتمال

درس ۱: قانون احتمال کل

احتمال وقوع یک پیشامد

اگر A پیشامدی از فضای نمونه‌ای S باشد، احتمال رخدادن A برابر است با:

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)}$$

مثال: یک سکه را ۳ بار می‌اندازیم (با ۳ سکه را یک بار می‌اندازیم). با چه احتمالی:

(الف) هر سه بار «بیشتر» ظاهر می‌شود.

(ب) حداقل یک بار «رو» ظاهر می‌شود.

(پ) تعداد «رو»ها بیشتر از تعداد «بیشتر»ها است.

پاسخ: دقت کنید که مسائل جنبش فرزندان و پرتاب سکه‌ها مانند هم حل می‌شوند.

(ممکن است به جای ۳ بار پرتاب سکه، گفته شود خالواده‌ای ۳ فرزند دارد.)

$$n(S) = 2^3 = 8, \quad A = \{(P, P, P)\}$$

(الف)

همه پیش

$$\Rightarrow n(A) = 1 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{8}$$

(ب) حداقل یک بار «رو» یعنی یک بار «رو» باید و یا اصلًا «رو» نباید:

$$A = \{(P, P, P), (R, P, P), (P, R, P), (P, P, R)\}$$

همه پیش بایند (اصلًا رو نباید).

$$\Rightarrow n(A) = 4 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

$$A = \{(R, R, P), (R, P, R), (P, R, R), (R, R, R)\}$$

(ب)

$$\Rightarrow n(A) = 4 \Rightarrow P(A) = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$$

مثال: از جعبه‌ای که شامل ۳ مهره سبز، ۴ مهره قرمز و ۵ مهره آبی است، ۳ مهره

به تصادف خارج می‌کنیم. عطوب است محاسبه احتمالات زیر:

(الف) هر ۳ مهره، قرمز باشند.

(ب) هیچ ۲ مهره‌ای، همزنگ باشند.

(ت) حداقل ۲ مهره، آبی باشند.

$$n(S) = \binom{5+4+3}{3} = \binom{12}{3} = \frac{12!}{9!3!} = \frac{12 \times 11 \times 10 \times 9!}{9! \times 3 \times 2 \times 1} = 220.$$

(الف)

کل فرموزها

$$n(A) = \binom{4}{3} = 4 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{4}{220}.$$

هر ۳ آبی یا هر ۳ قرمز یا هر ۳ سبز \Rightarrow سه مهره همزنگ

(ب)

$$n(A) = \binom{3}{1} \times \binom{4}{1} \times \binom{5}{1} = 1 + 4 + 10 = 15 \Rightarrow P(A) = \frac{15}{220}.$$

(ب)

۱ آبی و ۱ قرمز و ۱ سبز \Rightarrow هیچ ۲ مهره‌ای همزنگ نباشد.

$$n(A) = \binom{3}{1} \times \binom{4}{1} \times \binom{5}{1} = 3 \times 4 \times 5 = 60 \Rightarrow P(A) = \frac{60}{220}.$$

(ت)

(۳) مهره آبی) یا (۱ مهره سبز) یا (۱ مهره قرمز و ۲ مهره آبی) \Rightarrow حداقل ۲ مهره آبی

$$n(A) = \binom{5}{2} \times \binom{4+2}{1} + \binom{5}{1} = 1 + 7 + 10 = 18.$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{18}{220}.$$

پاسخ: ابتدا مرکز و شعاع دایره را به دست می‌آوریم:

مرکز دایره:

$$x^2 + y^2 - 2x - 3 = 0$$

$$O \left[\begin{array}{l} -\frac{a}{r} = \frac{-(-2)}{2} = 1 \\ -\frac{b}{r} = -\frac{c}{r} = -\frac{3}{2} = -1.5 \end{array} \right]$$

$$r = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 - 4c} = \frac{1}{2} \sqrt{(-2)^2 + (-1)^2 - 4(-3)} =$$

$$= \frac{1}{2} \sqrt{4+12} = \frac{1}{2} \sqrt{16} = 2$$

شعاع $\begin{matrix} a \\ \uparrow \\ x \\ \uparrow \\ 2x + 1y - 1 = 0 \end{matrix}$ محاسبه می‌کنیم:


$$d = \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}} = \frac{|2(1) + 1(-1) + (-1)|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$$

واضح است که $d > 2$ است یعنی $d > r$ ، لذا خط با دایره متقاطع است.


وضع دو دایره نسبت به هم

فرض کنید ۲ دایره با مرکزهای O و O' و شعاعهای R و R' موجود باشند در این صورت اگر $R > R'$ باشد و O و O' را بنامیم، حالت‌های زیر را خواهیم داشت:

$d > R + R'$	$d = R + R'$	$d = R - R'$
دو دایره از هم برخوردارند. (متجلد)	دو دایره خارج یکدیگر بوده و مماس‌اند. (مماس خارج)	دو دایره از داخل برخورد ندارند. (مماس داخل)



$R - R' < d < R + R'$	$d < R - R'$	$d = 0$
دو دایره کوچک، داخل دایرة بزرگ بوده و نقطه برخورد را قطع می‌کنند. (متقطع)	دو دایره هم مرکز ندارند. (متداخل)	دو دایره هم مرکز خواهند بود.



مثال: دو دایره $x^2 + y^2 - 2x + 4y = -7$ نسبت به هم چه وضعی دارند؟

$$(x-1)^2 + (y+2)^2 = 7 \Rightarrow O(1, -2), R = \sqrt{7} = \sqrt{7}/2$$

$$x^2 + y^2 - 2x + 4y = -7 \Rightarrow O(1, -2), R = \sqrt{7} = \sqrt{7}/2$$

$$\Rightarrow O' \left[\begin{array}{l} -\frac{a}{r} = -\frac{-2}{2} = 1 \\ -\frac{b}{r} = -\frac{4}{2} = -2 \\ -\frac{c}{r} = -\frac{-7}{2} = 3.5 \end{array} \right], R' = \frac{1}{2} \sqrt{a^2 + b^2 - 4c} = \frac{1}{2} \sqrt{4+16-16} = 1$$

$$\left\{ \begin{array}{l} OO' = d = \sqrt{(1-1)^2 + (-2+2)^2} = \sqrt{1+1} = \sqrt{2} = 1/\sqrt{2} \\ R - R' = 1/\sqrt{2} - 1 = 1/\sqrt{2}, R + R' = 1/\sqrt{2} + 1 = 2/\sqrt{2} = 2/\sqrt{2} \end{array} \right.$$

$\Rightarrow d < R - R'$ \Rightarrow دو دایره متداخل‌اند.

اگر پیشامدهای A و B به گونه‌ای باشد که وقوع یا عدم وقوع یکی، در وقوع دیگری تأثیری نداشته باشد آن‌ها را مستقل می‌گویند. مانند زوج‌آمدن عدد تاس و پشت‌آمدن سکه در پرتاب سکه و تاس با هم، در این حالت می‌توان گفت:

$$P(A \cap B) = P(A) \times P(B)$$

نکته اگر A و B مستقل باشند، آن‌گاه پیشامدهای A و B'، پیشامدهای A' و B و پیشامدهای A' و B' نیز مستقل خواهند بود.

مثال مادری دارای ۵ فرزند است. با چه احتمالی فرزند وسط پسر و فرزند آخر دختر است؟

پاسخ جنبشیت هر فرزند، تأثیری در جنبشیت بقیه فرزندان ندارد لذا

$$P(A) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times P(\text{آخری دختر}) \times P(\text{وسطی پسر}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$

مثال می‌دانیم احتمال این که RH خون فردی، منفی باشد $\frac{1}{16}$ است. با چه احتمالی، در یک خانواده، اولین فرزند با RH خون منفی، فرزند سوم خانواده است؟

پاسخ طبق فرض، احتمال داشتن RH خون منفی، $\frac{1}{16}$ است، پس احتمال داشتن RH خون مثبت، برابر $\frac{15}{16}$ است. اولین فرزند که RH خون منفی دارد فرزند سوم است پس دو فرزند اول، RH خون مثبت دارند؛ ضمناً پیشامدها مستقل‌اند. لذا:

$$(دومنی RH مثبت) \times (اولی RH مثبت) = P(A) \times P(B)$$

$$\times P(RH \text{ منفی}) = \frac{15}{16} \times \frac{1}{16} = \frac{15}{256}$$

احتمال شرطی

گاهی اوقات، قبل از وقوع A پیشامد دیگری مانند B رخ می‌دهد که روی احتمال وقوع تأثیر می‌گذارد. مثلاً در پرتاب یک تاس احتمال ظاهرشدن عدد ۳ برابر $\frac{1}{6}$ است، اما اگر بدانیم عدد ظاهرشده، عددی اول است (۲ یا ۳ یا ۵) در این صورت، احتمال ظاهرشدن عدد ۳ برابر $\frac{1}{3}$ خواهد شد.

تعییف فرض کنید A و B دو پیشامد باشند به شرطی که $P(B) \neq 0$ باشد، در این صورت اگر B قبیل از A رخ داده باشد، آن‌گاه احتمال وقوع A را با $P(A | B)$ نمایش می‌دهیم و خواهیم داشت:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

اگر A
و B مستقل باشند.

$$P(A | B) = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A)$$

$$P(B | A) = \frac{P(B \cap A)}{P(A)} \Rightarrow \frac{1}{10} = \frac{P(B \cap A)}{\frac{1}{10}} \Rightarrow P(B \cap A) = \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$\Rightarrow P(B \cap A) = \frac{1}{10} \times \frac{1}{10} = \frac{1}{100}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$\Rightarrow P(A \cup B) = \frac{1}{10} + \frac{1}{10} - \frac{1}{100} = \frac{19}{100} = \frac{59}{100}$$

مثال اگر A و B دو پیشامد مستقل باشند و $P(A') = \frac{3}{10}$ باشد، $P(A | B)$ را پیدا کنید.

احتمال وقوع متمم یک پیشامد، گاهی اوقات، تعداد اعضای پیشامد مطلوب A بسیار زیاد و پیدا کردن آن‌ها وقت‌گیر است. در این گونه موقعیت بهتر است ابتدا احتمال و خندان A (یعنی رخدادن A') را حساب کنیم و سپس به کمک

$$\text{فرمول ۱: } P(A') = 1 - P(A) \quad \text{پاسخ ۱: } P(A) = 1 - P(A')$$

مثال در یک خانواده ۳ فرزندی، با چه احتمالی، حداقل یک فرزند، دختر است؟

پاسخ برای پاسخ به این سوال دو روش وجود دارد:

راه ۱ حداقل یک دختر یعنی ۱ دختر با ۲ دختر که نوشتند این اعضا با

توجه به فضای نمونه، کمی وقت‌گیر است لذا بهتر است از پیشامد متمم استفاده کنیم:

$$n(S) = 2^3 = 8$$

= حداقل یکی از فرزندان دختر باشد
= هیچ‌کدام از فرزندان دختر نباشد

$$A' = \{(b, b, p)\} \Rightarrow n(A') = 1 \Rightarrow P(A') = \frac{n(A')}{n(S)} = \frac{1}{8}$$

$$P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{1}{8} = \frac{7}{8}$$

راه ۲ اگر بخواهیم این سوال را بدون استفاده از A' حل کنیم باید به این نکته توجه کنیم که اگر بخواهیم از بین n فرزند، k فرزند پسر (دختر) باشد می‌توانیم (n choose k) به دست آوریم. در مورد پرتاب سکه‌ها و از مون‌های چندگزینه‌ای هم، می‌توان از این نکته استفاده کرد.

$$n(A) = \binom{3}{1} + \binom{3}{2} + \binom{3}{3} = 3 + 3 + 1 = 7 \Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{7}{8}$$

قانون جمع احتمالات

اگر A و B دو پیشامد دلخواه باشند، آن‌گاه:

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

با حداقل ۱ دختر
با حداقل ۲ دختر با ۱ دختر
با ۱ دختر با ۲ دختر با ۳ دختر

پیشامدهای ناسازگار اگر دو پیشامد A و B توانند با هم رخ دهند، آن‌ها را ناسازگار می‌گوییم. مثل این که در پرتاب یک تاس، عدد ظاهرشده، هم فرد و هم زوج باشد. اگر دو پیشامد A و B ناسازگار باشند، آن‌گاه $A \cap B = \emptyset$ خواهد بود و در نتیجه:

$$P(A \cap B) = 0$$

مثال فرض کنید در جامعه‌ای، درصد نوع خون به شرح زیر باشد:

گروه خونی	A	B	AB	O
درصد	۴۱	۹	۴	۴۶

فرد محرومی را به بخش اورژانس آورده‌اند. با چه احتمالی، گروه خونی وی A یا B خواهد بود؟

پاسخ دو پیشامد داشتن گروه خونی A و داشتن گروه خونی B ناسازگارند. چون یک فرد، نمی‌تواند هم گروه خونی A و هم گروه خونی B داشته باشد لذا $P(A \cap B) = 0$ خواهد بود.


$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.41 + 0.09 = 0.50$$

ضرف

قانون احتمال کل

در بعضی سوالات، چند احتمال تودرتو وجود دارد مثلاً فرض کنید گفته شود ۴۵ درصد افراد یک دانشکده پسر و بقیه دختر هستند و ضمناً ۱۰ درصد دختران، متاهل و درصد پسران نیز متأهل اند. حالا یک نفر را تصادفاً انتخاب می‌کنیم، با چه احتمالی پسر و مجرد است؟ بهتر است وقتی با این‌گونه سوالات مواجه می‌شویم از روش شاخه‌بندی (نمودار درختی) استفاده کنیم. به مثال زیر توجه کنید و سپس خودتان احتمال پسر و مجرد بودن این فرد را حساب کنید.

مثال: فرض کنید انتقال نوعی بیماری ارثی از والدین به فرزند پسر ۱۲٪ و به فرزند دختر ۹٪ باشد. والدینی که حامل این نوع بیماری هستند در انتقالار تولد فرزندی هستند. با چه احتمالی این فرزند سالم است؟



$$\Rightarrow \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \right) + \left(\frac{1}{2} \times \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

احتمال مطلوب

پاسخ: می‌دانیم احتمال این که یک فرزند پسر یا دختر باشد $\frac{1}{2}$ است؛ لذا

$$P(A') = \frac{3}{10} \Rightarrow P(A) = 1 - P(A') = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$$

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A) \cdot P(B)}{P(B)} = P(A) = \frac{7}{10}$$

نکته: در مسائل احتمالی شرطی، همیشه بیشامد B (بیشامدی که زودتر رخ می‌دهد) را به عنوان فضای نمونه‌ای جدید در نظر می‌گیریم و سپس اعضای بیشامد A را از بین اعضای B انتخاب می‌کنیم.

مثال: یک تاس را ۲ بار پرتاب می‌کنیم. می‌دانیم مجموع اعداد ظاهرشده برابر ۸ است. با چه احتمالی، این دو عدد با هم برابرند؟

پاسخ: می‌دانیم مجموع دو عدد ظاهرشده ۸ است، پس الان $n(S)$ دیگر برابر با ۳۶ نیست و خواهیم داشت:

$$B = S = \{(2,6), (6,2), (3,5), (5,3), (4,4)\} \Rightarrow n(S) = 5$$

$$A = \{(4,4)\} \Rightarrow n(A) = 1$$

$$\Rightarrow P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} = \frac{1}{5}$$

همان $P(A | B)$ است.

تلاشی در سپرمه فقهی



- دانلود گام به گام تمام دروس 
- دانلود آزمون های قلم چی و گاج + پاسخنامه 
- دانلود جزوه های آموزشی و شب امتحانی 
- دانلود نمونه سوالات امتحانی 
- مشاوره کنکور 
- فیلم های انگیزشی 

 Www.ToranjBook.Net

 ToranjBook_Net

 ToranjBook_Net