



آزمون تابستان «۲۸ شهریور ۱۴۰۴» دفترچه اول اختصاصی دوازدهم ریاضی (ریاضیات)

دفترچه سوال

مدت زمان کل پاسخ‌گویی سوالات: ۱۲۰ دقیقه

تعداد کل سوالات: ۸۰ سوال

(۳۰ سوال اجباری + ۵۰ سوال اختیاری)

نام درس	تعداد سؤال	شماره سؤال	زمان پاسخ‌گویی
اجباری	۱۰	۱-۱۰	۱۵'
اختیاری	۱۰	۱۱-۲۰	۱۵'
اختیاری	۱۰	۲۱-۳۰	۱۵'
اختیاری	۱۰	۳۱-۴۰	۱۵'
اختیاری	۱۰	۴۱-۵۰	۱۵'
اختیاری	۱۰	۵۱-۶۰	۱۵'
اختیاری	۱۰	۶۱-۷۰	۱۵'
اختیاری	۱۰	۷۱-۸۰	۱۵'
جمع کل	۸۰	۱-۸۰	۱۲۰'

پدیدآورندگان

نام درس	نام طراحان
ریاضیات پایه و حسابان ۲	کاظم اجلایی-علی آزاد-مهدی براتی-شاهین پروازی-عادل حسینی-سجاد داوطلب-وحید راحت-علی سرآبادانی-تیما سلطانی-احسان صادقی-حمید علیرزاده-احسان غنی‌زاده-حمید مام‌قادی-سیدسپهر متولیان-امیر مرادیان-علی مرشد-مجتبی نادری-مهدی نصراللهی-امین نصراله-حسن نصرتی-ناهوک-جهانبخش نیکنام
هندسه	امیرحسین ابومحبوب-عباس اسدی-امیرآبادی-علی ایمانی-محمد پجیرایی-جواد حاتمی-حسین حاجیلو-محمد خندان-شهریار رحمانی-علیرضا شریف‌خطیبی-علی فتح‌آبادی-فرشاد فراسری-محمد ابراهیم گیتی‌زاده-سینا محمدپور-مهرداد ملوندی-سیلا منصوری-سرژ یقیا زاریان-تبریزی
آمار و احتمال و ریاضیات گسسته	امیرحسین ابومحبوب-رضا توکلی-جواد حاتمی-فرزانه خاکپاش-محمد خندان-علیرضا شریف‌خطیبی-مرتضی فهم‌علوی-مهرداد ملوندی-نیلوفر مهدی-سروش موئینی-هومن نورانی

ناشر: در مسیر موفقیت

گزينشگران و ویراستاران

نام درس	ریاضیات پایه و حسابان ۲	هندسه	آمار و احتمال و ریاضیات گسسته
گزينشگر	سیدسپهر متولیان	مهرداد ملوندی	مهرداد ملوندی
گروه ویراستاری	امیرحسین ابومحبوب یاسین کشاورزی مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی	امیرحسین ابومحبوب مهرداد ملوندی
مسئول درس	سیدسپهر متولیان	مهرداد ملوندی	مهرداد ملوندی
مسئند سازی	سمیه اسکندری	سجاد سلیمی	سجاد سلیمی
ویراستاران (مسئندسازی)	معصومه صنعت کار-مهسا محمدنیا-احسان میرزایی-سجاد سلیمی-فرشته کیمرانی		

گروه هنر و تولید

مدیر گروه	مهرداد ملوندی
مسئول دفترچه	نرگس غنی‌زاده
گروه مسئولندسازی	مدیر گروه: مجا اصفری
حقوق‌نگار	فرزانه فتح‌آله‌زاده
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون

بنیاد علمی آموزشی قلمچی «وقف عام»

دفتر مرکزی: خیابان انقلاب بین مهاباد و فلسطین - پلاک ۹۲۴ - تلفن: ۰۲۱-۶۴۴۴



وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

حسابان ۱: حد و پیوستگی صفحه‌های ۱۱۲ تا ۱۵۱

پاسخ دادن به این سؤالات برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

۱- مجموعه $(1, a-3b) \cup (2a+b, 4a-b)$ نشان دهنده همسایگی متقارن محذوف نقطه x است. مقدار x کدام می‌تواند باشد؟


۶ (۴)

۵ (۳)

۴ (۲)

۳ (۱)

۲- با توجه به نمودار تابع $f(x)$ ، اگر $\lim_{x \rightarrow 3} f(x) = a$ باشد، حاصل $\left(\lim_{x \rightarrow a^+} [f(x)] \right) - \left[\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) \right]$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است).




-۱۶ (۱)

-۲۰ (۲)

-۱۹ (۳)

-۲۱ (۴)

۳- کدام گزینه در مورد شکل مقابل صحیح نیست؟



(۱) تابع f در همسایگی محذوف ۳ تعریف شده است و در این نقطه حد دارد.

(۲) تابع f در همسایگی صفر تعریف شده است و مقدار تابع یا حد راست برابر نیست.

(۳) تابع f در همسایگی چپ و راست صفر تعریف شده است ولی در این نقطه حد ندارد.

(۴) تابع f در همسایگی چپ و راست ۳ تعریف شده است و حد تابع یا مقدار تابع در این نقطه برابر است.

۴- حاصل $\lim_{x \rightarrow (\frac{1}{4})^-} \left[\frac{1}{x} \right] + \lim_{x \rightarrow (\frac{1}{4})^-} \left[-\frac{2}{x} \right]$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است).

-۴ (۴)

-۲ (۳)

-۱ (۲)

-۳ (۱)

۵- حاصل $\lim_{x \rightarrow \frac{5\pi}{4}} \frac{[\cos x] + 2}{\sin 4x - 1}$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است).

$-\frac{3}{2}$ (۴)

$\frac{3}{2}$ (۳)

۱ (۲)

-۱ (۱)

۶- اگر دو تابع $f(x)$ و $g(x)$ در $x=a$ حد داشته باشند و بدانیم $\lim_{x \rightarrow a} g'(x) = \frac{1}{25}$ و $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 4$ حاصل $\lim_{x \rightarrow a} (g(x) - 2f(x))$ کدام می تواند باشد؟

(۱) $-\frac{3}{5}$

(۲) $\frac{7}{5}$

(۳) $-\frac{4}{5}$

(۴) $\frac{6}{5}$

۷- اگر $\lim_{x \rightarrow -1} \frac{2x^2 + x^2 + ax + b}{x^2 - x - 2} = -2$ باشد، مقدار $a+b$ کدام است؟

(۴) ۵

(۳) ۴

(۲) ۳

(۱) ۱

۸- اگر $f(x) = \frac{\sqrt[4]{x} - x}{|x^2 - 64|}$ حاصل $\lim_{x \rightarrow 3} f(x^2 - 6x + 17)$ کدام است؟

(۱) $-\frac{1}{24}$

(۲) $-\frac{1}{8}$

(۳) $\frac{1}{24}$

(۴) $\frac{1}{8}$

۹- تابع $f(x) = \begin{cases} \frac{a \sin 6x}{6x - \pi} & ; x > \frac{\pi}{6} \\ b[4 \sin x] + [-\frac{\pi}{x}] & ; x \leq \frac{\pi}{6} \end{cases}$ در $x = \frac{\pi}{6}$ پیوسته است. حاصل $a-b$ کدام است؟ ([]، نماد جزء صحیح است).

(۱) ۷

(۲) ۱۰

(۳) -۷

(۴) ۹

۱۰- اگر تابع $f(x) = [x](x-1)$ بر بازه $(0, a)$ پیوسته باشد، بیشترین مقدار a کدام گزینه می باشد؟ ([]، نماد جزء صحیح است).

(۱) ۴

(۲) ۳

(۳) ۲

(۴) ۱



وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

حسابان ۲: تابع + مثلثات صفحه‌های ۴۴ تا ۴۱

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اختیاری است.

- ۱۱- طول نقاط نمودار تابع $f(x) = \begin{cases} 2 - \sqrt{1-x} & ; x < 1 \\ 3x - x^2 & ; x \geq 1 \end{cases}$ را بر ۲ تقسیم می‌کنیم و سپس نمودار را $\frac{5}{4}$ واحد به سمت پائین انتقال می‌دهیم. مجموع صفرهای تابع جدید کدام است؟

$\frac{47}{32}$ (۴)

$\frac{73}{8}$ (۳)

$\frac{55}{32}$ (۲)

$\frac{7}{16}$ (۱)

- ۱۲- تابع $f(x) = x^2 - 6|x - 2|$ روی بازه $[a, 2]$ اکیدا صعودی و روی بازه $[2, b]$ اکیدا نزولی است. حداکثر مقدار $b - a$ کدام است؟

$\frac{5}{4}$ (۴)

۶ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

- ۱۳- خارج قسمت تقسیم چندجمله‌ای $P(x) = x^5(x^5 + 1)$ بر $x^2 + x$ را $Q(x)$ می‌نامیم. مقدار $Q(-1)$ کدام است؟


صفر (۴)

۵ (۳)

۱ (۲)

۲ (۱)

- ۱۴- بخشی از نمودار تابع $f(x) = a \sin^2 b\pi x + c$ در شکل زیر رسم شده است، مقدار $f(1201)$ کدام است؟



$-\frac{7}{4}$ (۱)

$-\frac{7}{2}$ (۲)

$-\frac{1}{2}$ (۳)

$\frac{3}{4}$ (۴)

- ۱۵- فقط سه عدد از بازه $(-a^2 + 1, 4)$ در دامنه تابع $f(x) = \tan\left(\frac{\pi x}{2}\right)$ قرار ندارند. مجموعه مقادیر ممکن برای $|a|$ کدام است؟

$(0, \sqrt{2}]$ (۴)

$[0, \sqrt{2})$ (۳)

$[\sqrt{2}, 2)$ (۲)

$(\sqrt{2}, 2]$ (۱)

- ۱۶- جواب کلی معادله $\sin^2 x + \cos^2 x = \frac{3}{4}$ (که $k \in \mathbb{Z}$) کدام است؟

$\frac{k\pi}{4} + \frac{\pi}{8}$ (۴)

$k\pi + \frac{\pi}{8}$ (۳)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{8}$ (۲)

$\frac{k\pi}{2} + \frac{\pi}{4}$ (۱)

- ۱۷- معادله $\frac{\theta}{2} + 2 = 0$ در بازه $[0, 2\pi]$ چند جواب دارد؟

صفر (۴)

۲ (۳)

۳ (۲)

۴ (۱)

- ۱۸- مجموع جواب‌های معادله $\sin(x + \frac{\pi}{4}) + \sin(x + \frac{3\pi}{4}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ در بازه $[-\frac{\pi}{4}, \pi]$ کدام است؟

$\frac{2\pi}{3}$ (۴)

$\frac{\pi}{6}$ (۳)

$\frac{\pi}{2}$ (۲)

صفر (۱)

- ۱۹- اگر $\tan \alpha = \frac{\sqrt{2}}{3}$ و $\tan \beta = \frac{\sqrt{2}}{2}$ باشد، $\tan(2\alpha - \beta)$ برابر کدام است؟

$\frac{5\sqrt{2}}{26}$ (۴)

$\frac{19\sqrt{2}}{2}$ (۳)

$\frac{23\sqrt{2}}{10}$ (۲)

$\frac{\sqrt{2}}{17}$ (۱)

- ۲۰- مجموع جواب‌های معادله $\tan(x - \frac{\pi}{4}) = 1 + \tan 2x$ در بازه $(0, 2\pi)$ کدام است؟

$\frac{3\pi}{2}$ (۴)

$\frac{2\pi}{4}$ (۳)

2π (۲)

π (۱)

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

ریاضی ۱: شمارش، بدون شمردن + آمار و احتمال: صفحه‌های ۱۳۳ تا ۱۷۰

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اختیاری است.

۲۱- اگر $\binom{13}{x^2+1} = \binom{13}{6x-4}$ باشد، آن‌گاه مجموع مقادیر ممکن برای x کدام است؟


۱ (۴)

۳ (۳)

۸ (۲)

۲ (۱)

۲۲- با ۱۰ نقطه بر روی شکل روبه‌رو چند مثلث می‌توان رسم کرد؟



۱۱۰ (۱)

۱۰۹ (۲)

۱۲۰ (۳)

۱۱۹ (۴)

۲۳- از بین n کتاب ریاضی و $n-1$ کتاب شیمی، به ۲۵ حالت می‌توانیم ۲ کتاب هم‌مبحث را انتخاب کنیم. به چند طریق می‌توانیم ۴

کتاب از مجموع کتاب‌ها انتخاب کنیم؟

۱۵ (۴)

۳۵ (۳)

۱۲۶ (۲)

۳۳۰ (۱)

۲۴- می‌خواهیم با کنار هم قرار دادن حروف کلمه DYNAMICS به طور تصادفی کلمات هشت حرفی بسازیم. احتمال آن‌که کلمه

ساخته شده با حرف A شروع نشود و حروف کلمه MIC سه حرف آخر آن باشد، کدام است؟

$\frac{2}{25}$ (۴)

$\frac{3}{70}$ (۳)

$\frac{1}{70}$ (۲)

$\frac{7}{60}$ (۱)

۲۵- اگر یک زیرمجموعه پنج عضوی از مجموعه $\{A, B, C, D, E, F, G\}$ انتخاب کنیم، احتمال این‌که عضو A در آن باشد و

عضوهای E و F هم‌زمان در آن نباشند، کدام است؟

$\frac{1}{3}$ (۴)

$\frac{5}{7}$ (۳)

$\frac{1}{21}$ (۲)

$\frac{3}{7}$ (۱)

۲۶- در ظرفی ۳ مهره آبی و تعدادی مهره سبز داریم. به تصادف ۲ مهره از این ظرف خارج می‌کنیم. اگر احتمال هم‌رنگ‌بودن دو مهره

$\frac{1}{4}$ باشد، تعداد مهره‌های سبز کدام می‌تواند باشد؟

- (۱) ۸ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴) ۵

۲۷- دو تاس را پرتاب می‌کنیم. پیشامد آن‌که تفاضل اعداد رو شده بیشتر از ۲ باشد را A و پیشامد آن‌که اعداد رو شده در هر دو

تاس فرد باشد را B می‌نامیم. پیشامد $A' - B$ چند عضو دارد؟

- (۱) ۲۳ (۲) ۱۵ (۳) ۲۶ (۴) ۱۷

۲۸- کدام یک از گزینه‌های زیر درست نیست؟

(۱) مجموعه تمام افراد یا اشیا که درباره یک یا چند ویژگی آن‌ها تحقیق صورت گیرد جامعه است.

(۲) حجم جامعه آماری، برابر تعداد اعضای آن جامعه است.

(۳) نمونه، زیرمجموعه‌ای از جامعه است.

(۴) به هیچ عنوان امکان بررسی تمام اعضای جامعه وجود ندارد.

۲۹- متغیرهای «جرم یک درخت»، «تعداد گل‌های یک بازیکن»، «جنسیت افراد» و «فصل‌های یک سال» به ترتیب از راست به چپ

چه نوع کمیت‌هایی هستند؟

(۱) کمی پیوسته - کمی گسسته - کیفی اسمی - کیفی ترتیبی

(۲) کمی گسسته - کیفی ترتیبی - کیفی اسمی - کمی پیوسته

(۳) کمی پیوسته - کمی گسسته - کیفی ترتیبی - کمی گسسته

(۴) کمی پیوسته - کیفی ترتیبی - کیفی اسمی - کیفی ترتیبی

۳۰- نوع متغیر کدام یک از موارد زیر با بقیه متفاوت است؟

(۱) سرعت دوندگان یک مسابقه (۲) تعداد ماشین‌های یک پارکینگ

(۳) تعداد ملیت‌های افراد یک قاره (۴) تعداد دروس یک پایه تحصیلی


وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

هندسه ۲: روابط طولی در مثلث صفحه‌های ۷۴ تا ۵۹

پاسخ دادن به این سؤالات برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

۳۱- مطابق شکل، دو ایستگاه رادار، هواپیمایی را با زاویه‌های 60° و 45° درجه رصد کرده‌اند. اگر مجموع فاصله‌های هواپیما از دو

ایستگاه برابر $\sqrt{3} + \sqrt{2}$ کیلومتر باشد، آنگاه فاصله این دو ایستگاه از یکدیگر چند کیلومتر است؟ $\left(\sin 75^\circ = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4}\right)$




(۱) $2\sqrt{2}$

(۲) $2(\sqrt{3} - \sqrt{2})$

(۳) $\sqrt{6} - \sqrt{2}$

(۴) $\frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{2}$

۳۲- در شکل مقابل، اندازه شعاع دایره محیطی چهارضلعی ABCD کدام است؟



(۱) $\frac{4\sqrt{77}}{7}$

(۲) $\frac{7\sqrt{22}}{2}$

(۳) $\frac{2\sqrt{77}}{7}$

(۴) $\frac{7\sqrt{22}}{4}$

۳۳- در مثلث متساوی‌الاضلاع ABC به طول ضلع ۱۵ واحد، نقطه D روی ضلع BC به فاصله ۱۳ واحد از رأس A قرار دارد. فاصله

نقطه D از ضلع AB، چند برابر فاصله آن از ضلع AC است؟ $(BD < CD)$

(۲) $\frac{5}{6}$

(۱) $\frac{13}{75}$

(۴) $\frac{1}{875}$

(۳) $\frac{1}{75}$

۳۴- در یک مثلث قائم‌الزاویه، نیمساز وارد بر وتر، آن را به دو پاره‌خط به طول‌های ۲ و ۶ تقسیم می‌کند. مساحت این مثلث کدام است؟

(۲) $\frac{10}{8}$

(۱) $\frac{9}{6}$

(۴) $\frac{13}{2}$

(۳) ۱۲

محل انجام محاسبات

۳۵- در مثلث ABC به اضلاع $AB=6$ ، $AC=7$ و $BC=9$ ، نیمساز زاویه داخلی A ، میانه CM را در نقطه I قطع می‌کند.

طول پاره خط MI کدام است؟

(۲) $\frac{\sqrt{14}}{5}$

(۱) $\frac{\sqrt{14}}{6}$

(۴) $\frac{3\sqrt{14}}{5}$

(۳) $\frac{\sqrt{14}}{2}$

۳۶- در مثلث ABC ، اگر $AB=6$ ، $AC=9$ و $\hat{A}=120^\circ$ باشد، طول نیمساز داخلی AD کدام است؟


(۴) ۴

(۳) $\frac{3}{6}$

(۲) $\frac{3}{2}$

(۱) ۳

۳۷- در شکل مقابل، طول ضلع AC کدام است؟




(۱) $\frac{7}{5}$

(۲) ۸

(۳) $\frac{8}{5}$

(۴) ۹

۳۸- در شکل مقابل با توجه به اندازه‌های داده شده، مساحت چهارضلعی $ABCD$ چند برابر $\sqrt{3}$ است؟



(۱) ۳


(۲) ۴

(۳) ۵

(۴) ۶



۳۹- در شکل مقابل، اندازه شعاع دایره محاطی داخلی کدام است؟



(۱) $\sqrt{15}$

(۲) $3\sqrt{2}$

(۳) $\sqrt{21}$

(۴) $2\sqrt{6}$

۴۰- در مثلث ABC ، ضلع $BC=6$ و میانه $AM=6$ است. اگر نیمسازهای دو زاویه AMB و AMC ، دو ضلع AB و AC را

به ترتیب در نقاط P و Q قطع کنند، آن‌گاه مقدار $MP^2 + MQ^2$ کدام است؟

(۲) ۹

(۱) ۴

(۴) ۱۸

(۳) ۱۶

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

هندسه ۳: ماتریس و کاربرد آن صفحه‌های ۳۱ تا ۳۹

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اختیاری است.

۴۱- ماتریس $A = \begin{bmatrix} 2a+1 & a-2 \\ b+1 & a-b \end{bmatrix}$ یک ماتریس قطری و ماتریس $B = \begin{bmatrix} a & b+1 \\ a-2 & c \end{bmatrix}$ یک ماتریس اسکالر است. مجموع درایه‌های

ماتریس AB کدام است؟

(۱) -10 (۲) 10

(۳) -16 (۴) 16

۴۲- اگر $A = \begin{bmatrix} a & 2 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$ و $B = \begin{bmatrix} 3 & b \\ 2 & -1 \end{bmatrix}$ و ماتریس $B \times A$ ماتریسی قطری باشد، آنگاه مجموع درایه‌های ماتریس $B \times A$ کدام است؟

(۱) 6 (۲) صفر

(۳) -6 (۴) -12

۴۳- اگر $A^T = 2A - 4I$ و $A^{-1} = mA + nI$ باشد، حاصل $m + n$ کدام است؟

(۱) $-\frac{1}{2}$ (۲) -1

(۳) $\frac{1}{2}$ (۴) 1

۴۴- اگر $A = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$ ، آنگاه مجموع مجهولات دستگاه $AX = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \end{bmatrix}$ چند برابر مجموع مجهولات دستگاه $AX' = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ است؟

(۱) -3 (۲) -2

(۳) 3 (۴) 2

۴۵- کدام یک از دستگاه معادلات زیر بی‌شمار جواب دارد؟

(۱) $\begin{cases} 2x - y = 2 + 2y \\ -2x + 6y = x + 1 \end{cases}$ (۲) $\begin{cases} x - 2y = 2 + y \\ -2x + 9y = x - 6 \end{cases}$

(۳) $\begin{cases} 2x - 4y = y - 1 \\ x + y = 8 - x \end{cases}$ (۴) $\begin{cases} x + 2y = 5 - y \\ -x - 6y = x + 1 \end{cases}$

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون  مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

۴۶- اگر A و B دو ماتریس مربعی مرتبه ۲ و $|A+B|=6$ و $|B|=2$ باشد، دترمینان ماتریس $AB^{-1}+I$ کدام است؟

۱۲ (۲)

۶ (۱)

۳ (۴)

$\frac{1}{3}$ (۳)

۴۷- اگر $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & -2 \end{bmatrix}$ ، B ماتریسی اسکالر از مرتبه ۳ و $|B|=|A^T|$ باشد، آنگاه مجموع درایه‌های ماتریس B کدام است؟

-۱۲ (۲)

۱۲ (۱)

-۲۴ (۴)

۲۴ (۳)

۴۸- ماتریس وارون پذیر $A = \begin{bmatrix} |A|^2 & 4|A| \\ 2 & |A| \end{bmatrix}$ مفروض است. مقدار مثبت $\frac{|A|^2-1}{|A|+2}$ چقدر است؟

$\frac{1}{8}$ (۲)

$\frac{1}{6}$ (۱)

$\frac{2}{4}$ (۴)

۲ (۳)



۴۹- معادله $\begin{vmatrix} \cdot & x-a & x-b \\ a-x & \cdot & x-c \\ b-x & c-x & \cdot \end{vmatrix} = 0$ دارای چند جواب حقیقی است؟

۲ (۲)

۱ (۱)

بی‌شمار (۴)

۳ (۳)

۵۰- معادله $\begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ 1 & x^2 & x^3 \\ 1 & x^3 & x \end{vmatrix} = 0$ چند ریشه متمایز دارد؟

۲ (۲)

۳ (۱)

بی‌شمار (۴)

۱ (۳)

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

هندسه ۱: تجسم فضایی: صفحه‌های ۷۷ تا ۹۶

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش آموزان اختیاری است.

۵۱- از یک نقطه خارج یک صفحه به ترتیب از راست به چپ، چند خط و چند صفحه عمود بر صفحه مفروض می‌توان رسم کرد؟

(۱) یک - یک (۲) یک - بی‌شمار

(۳) بی‌شمار - بی‌شمار (۴) بی‌شمار - یک

۵۲- دو صفحه متقاطع P و Q برهم عمودند و فصل مشترک آنها خط d است. گزینه نادرست کدام است؟

(۱) هر خط موازی با P ، بر صفحه Q عمود است.

(۲) هر خط عمود بر P ، با صفحه Q موازی یا بر آن واقع است.

(۳) هر صفحه عمود بر خط d ، بر دو صفحه P و Q عمود است.

(۴) صفحه گذرنده از خط d و عمود بر Q ، بر صفحه P متطبق است.

۵۳- دو خط متناظر d و d' با صفحه P متقاطع هستند. چند خط یافت می‌شود که این دو خط را قطع کند و با صفحه P موازی باشد؟



(۱) هیچ (۲) یک

(۳) دو (۴) بی‌شمار

۵۴- هر قطر یک مکعب با چند یال آن مکعب متناظر است؟

(۱) ۴ (۲) ۶ (۳) ۸ (۴) ۱۰

۵۵- تفاضل حداقل و حداکثر تعداد مکعب‌هایی که باید برداشته شود تا نمای بالای شکل A به صورت شکل B باشد، کدام است؟



(۱) ۳۷

(۲) ۲۱

(۳) ۱۸

(۴) ۱۲

محل انجام محاسبات

۵۶- روی تمام وجوه یک مکعب، عدد ۵ نوشته شده است. چه تعداد از این مکعبها را به صورت ستونی روی هم قرار دهیم تا مجموع

تمام اعدادی که قابل رؤیت هستند، برابر ۲۴۵ شود؟



۱ = (۲)

۹ (۱)

۱۲ (۴)

۱۱ (۳)

۵۷- مثلث متساوی الاضلاعی به طول ضلع $4\sqrt{3}$ را حول قاعده آن دوران داده‌ایم. در این صورت دو مخروط با قاعده یکسان حاصل می‌شود که شعاع قاعده هر کدام از آنها برابر است با

۳ (۴)

$2\sqrt{3}$ (۳)

۶ (۲)

$4\sqrt{3}$ (۱)

۵۸- اگر صفحه P ، کره‌ای به شعاع R را در فاصله $\frac{R}{4}$ از مرکز کره قطع کند و مساحت سطح مقطع حاصل 24π باشد، شعاع کره کدام است؟


$2\sqrt{6}$ (۲)

$2\sqrt{2}$ (۱)

$4\sqrt{6}$ (۴)

$4\sqrt{2}$ (۳)

۵۹- دوزنقه قائم الزاویه $ABCD$ را حول ضلع AD دوران داده و سپس شکل حاصل را با صفحه‌ای به موازات قاعده‌ها و به فاصله ۳ واحد از قاعده کوچک برش می‌دهیم. مساحت سطح مقطع حاصل کدام است؟




9π (۱)

16π (۲)

12π (۳)

20π (۴)

۶۰- در شکل زیر، مستطیلی به ابعاد ۶ و ۸، یکی از وجه‌های منشوری است که قاعده‌های آن مثلث‌های قائم الزاویه متساوی الساقین هستند. مساحت سطح مقطع صفحه شامل رأس قائمه قاعده بالایی و وتر قاعده پایینی، با این منشور کدام است؟



$10\sqrt{3}$ (۱)

$12\sqrt{2}$ (۲)

$4\sqrt{14}$ (۳)

$8\sqrt{13}$ (۴)

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

آمار و احتمال، آمار استنباطی، صفحه‌های ۹۷ تا ۱۲۱

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

- ۶۱- برای بررسی تأثیر نوشابه‌های گازدار روی معده و میزان قاجاق سوخت در مرزهای شرقی کشور در سال گذشته، بهتر است به ترتیب از کدام روش‌های گردآوری داده‌ها استفاده کنیم؟
 (۱) مشاهده - دادگان (۲) پرسش‌نامه - دادگان (۳) مصاحبه - مشاهده (۴) دادگان - پرسش‌نامه
- ۶۲- یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای تبلیغ و جذب بیش‌تر مشتری بین هر ۱۰۰۰ نفری که خرید می‌کنند، قرعه‌کشی و به تعدادی از آنها به‌طور تصادفی تخفیف ویژه می‌دهد. نحوه انتخاب این اشخاص از میان مشتریان بر اساس کدام نوع نمونه‌گیری است؟
 (۱) تصادفی ساده (۲) خوشه‌ای (۳) طبقه‌ای (۴) سامانمند
- ۶۳- کدام یک از تعاریف زیر نادرست است؟
 (۱) خط فقر برابر است با نصف میانگین درآمد افراد جامعه.
 (۲) آمارها از نمونه‌ای به نمونه دیگر تغییر می‌کنند.
 (۳) پارامتر مشخصه‌ای عددی است که در صورت داشتن داده‌های کل جامعه قابل محاسبه است.
 (۴) در بررسی یک جامعه، نمونه‌گیری اریب، ارزش بالایی دارد.
- ۶۴- در یک نمونه‌گیری سامانمند بین ۳۵۰ نفر که به ترتیب از شماره ۱ تا ۳۵۰ شماره‌گذاری شده‌اند، می‌خواهیم یک نمونه ۵۰ تایی انتخاب کنیم. اگر یکی از اعضای انتخابی شماره ۴۱ باشد، آنگاه کدام شماره انتخاب نشده است؟
 (۱) ۷۶ (۲) ۱۰۴ (۳) ۲۱۶ (۴) ۳۰۴
- ۶۵- کدام نمونه‌گیری اریب نیست؟
 (۱) نمونه‌گیری از مدرسان کتک‌ور برای بررسی وضعیت معیشتی معلمان تمام مقاطع.
 (۲) نمونه‌گیری از افراد در نظرسنجی یک وبگاه پرطرفدار برای رسیدن به حداکثر رأی مردم در مورد انتخاب رئیس‌جمهور.
 (۳) نمونه‌گیری از افراد حاضر در کتابخانه یک مدرسه برای بررسی میزان مطالعه دانش‌آموزان آن مدرسه.
 (۴) نمونه‌گیری از اولین نفر از هر ۱۰ دانش‌آموزی که از یک مدرسه خارج می‌شوند برای بررسی وسیله نقلیه مورد استفاده دانش‌آموزان این مدرسه.
- ۶۶- از اعداد صحیح ۰ تا N ، شش عدد ۰، ۳، ۴، ۶، ۸ و ۱۲ به تصادف انتخاب شده‌اند. برآورد نقطه‌ای از N به کمک پارامتر میانگین کدام است؟
 (۱) ۱۲ (۲) ۱۳ (۳) ۱۴ (۴) ۱۵
- ۶۷- در انتخاب یک نمونه دوتایی از مجموعه $S = \{1, 2, \dots, 99\}$ ، با کدام احتمال میانگین نمونه و جامعه یکسان است؟
 (۱) $\frac{1}{49}$ (۲) $\frac{0}{102}$ (۳) $\frac{1}{99}$ (۴) $\frac{0}{101}$
- ۶۸- اگر انحراف معیار برآورد میانگین نمونه‌ای ۳۶ تایی از یک جامعه برابر $\frac{1}{5}$ باشد، انحراف معیار برآورد میانگین نمونه‌ای ۳۲۴ تایی از این جامعه کدام است؟
 (۱) $\frac{0}{2}$ (۲) $\frac{0}{5}$ (۳) $\frac{0}{6}$ (۴) $\frac{0}{9}$
- ۶۹- انحراف معیار برآورد میانگین براساس نمونه‌ای از یک جامعه، کمتر از $\frac{0}{2}$ انحراف معیار آن جامعه است، حداقل اندازه نمونه کدام است؟
 (۱) ۲۵ (۲) ۲۶ (۳) ۲۵ (۴) ۲۶
- ۷۰- در یک نمونه با اندازه ۱۹۶، حد بالا و پایین فاصله اطمینان ۹۵ درصدی برای میانگین جامعه برابر ۴۸ و ۴۱ است. انحراف معیار جامعه چقدر است؟
 (۱) $\frac{24}{5}$ (۲) ۲۶ (۳) ۲۷ (۴) $\frac{28}{5}$

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

ریاضیات گسسته: آشنایی با نظریه اعداد صفحه‌های ۱ تا ۲۰

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اختیاری است.

۷۱- برای درستی گزاره $n^2 + 7n + 11$ به ازای هر عدد طبیعی n ، عددی اول است. می‌توان از روش استفاده کرد.

(۱) اثبات - در نظر گرفتن همه حالتها

(۲) اثبات - برهان خلف

(۳) رد - مثال نقض

(۴) رد - برهان خلف

۷۲- اگر باقی‌مانده تقسیم عدد a بر دو عدد ۷ و ۹ به ترتیب ۴ و ۵ باشد، باقی‌مانده تقسیم عدد a بر ۶۳ چقدر است؟

(۱) ۳۱ (۲) ۳۲ (۳) ۶۱ (۴) ۶۲

۷۳- باقی‌مانده تقسیم عدد $A = 2^{101} \times 3^{51}$ بر عدد ۱۳ کدام است؟

(۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۶ (۴) ۷

۷۴- اگر $6a + 27 \equiv a^{2460} \pmod{11}$ باشد، باقی‌مانده تقسیم عدد $9a^{32}a^2$ بر ۹ کدام است؟

(۱) صفر (۲) ۱ (۳) ۲ (۴) ۷

۷۵- کدام یک از معادلات همبستگی زیر در مجموعه اعداد صحیح جواب دارد؟

(۱) $30x \equiv 15 \pmod{42}$ (۲) $12x \equiv 9 \pmod{18}$ (۳) $8x \equiv 18 \pmod{20}$ (۴) $27x \equiv 21 \pmod{12}$


۷۶- کوچک‌ترین عدد سه رقمی که در معادله $43x \equiv 26 \pmod{17}$ صدق می‌کند، کدام است؟

(۱) ۱۰۱ (۲) ۱۰۳ (۳) ۱۰۵ (۴) ۱۰۷

۷۷- تیراندازی به سمت یک هدف، شامل دو دایره هم‌مرکز، تیراندازی می‌کند، اگر او تیر را به دایره با شعاع کوچک‌تر بزند ۷ امتیاز و

اگر به دایره بزرگ‌تر و خارج دایره کوچک‌تر بزند، ۵ امتیاز می‌گیرد، اگر او کمتر از ۱۰ تیر انداخته و همه تیرها به داخل دایره

بزرگ‌تر اصابت کرده باشد و در پایان ۶۱ امتیاز گرفته باشد، چند حالت برای او در این تیراندازی می‌تواند ثبت شود؟



(۱) ۱

(۲) ۲

(۳) ۳

(۴) ۴

۷۸- مجموع ارقام کوچک‌ترین عدد طبیعی سه رقمی x که در معادله $57x - 87y = 242$ صدق کند، کدام است؟

(۱) ۵ (۲) ۶ (۳) ۷ (۴) ۸

۷۹- به چند طریق می‌توان ۱۰۰ کیلوگرم برنج را به کیسه‌های ۳ و ۵ کیلوگرمی تقسیم کرد به گونه‌ای که تمام کیسه‌های استفاده شده

به‌طور کامل پر شوند؟

(۱) ۴ (۲) ۵ (۳) ۶ (۴) ۷

۸۰- به ازای چند عدد طبیعی دو رقمی n ، معادله سیاله $(4n+1)x + (2n-2)y = c$ به ازای هر عدد طبیعی دلخواه c ، در مجموعه

اعداد صحیح دارای جواب است؟

(۱) ۸۶ (۲) ۸۴ (۳) ۸۲ (۴) ۸۰

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات



آزمون تابستان «۲۸ شهریور ۱۴۰۴» دفترچه دوم اختصاصی دوازدهم ریاضی (فیزیک و شیمی)

دفترچه سوال

مدت زمان کل پاسخ گویی سوالات: ۷۵ دقیقه
تعداد کل سوالات: ۶۰ سوال
(۲۰ سوال اجباری + ۴۰ سوال اختیاری)

نام درس	تعداد سوال	شماره سوال	زمان پاسخگویی
اجباری	۲	۸۱-۹۰	۱۵'
اختیاری	۳	۹۱-۱۰۰	۱۵'
اختیاری	۱	۱۰۱-۱۱۰	۱۵'
اجباری	۲	۱۱۱-۱۲۰	۱۰'
اختیاری	۳	۱۲۱-۱۳۰	۱۰'
اختیاری	۱	۱۳۱-۱۴۰	۱۰'
جمع کل	۶۰	۸۱-۱۴۰	۷۵'

پدیدآورندگان

نام درس	نام طراحان
فیزیک	بابک اسلامی- زهره آقامحمدی- محمدعلی راست پیمان- بهنام رستمی- امیر ستارزاده- مهدی سلطانی- محمدرضا شیروانی- زاده محمد عظیم پور- پوریا علاقه مند- مسعود قره خانی- محسن قندچهر- مصطفی کیانی- علیرضا گوئه- غلامرضا محبی- امیر محمودی- انزلی حسین مخدومی- سیدعلی میرنوری- حسام نادری- مصطفی یاقفی
شیمی	مریم اکبری- محمدرضا پورچاوند- کامران جعفری- ایمان حسین نژاد- سوسنی خیاطعلیمحمدی- حمید ذبحی- یاسر راش- حسن رحمتی- کوکند فرزاد رضایی- روزبه رضایی- رضا سلیمانی- آروین شجاعی- سینا شرافتی- پور- امیرحسین طیبی- رسول عابدینی- زواره محمد عظیمیان- زواره محمدپارسا فراهانی- محمد کوهستانیان- حسن لشکری- محمدحسن محمدزاده- مقدم- سیدمحمد معروفی- سرتشی- نصیرزاده- محمد وزیری

گزینشگران و ویراستاران

نام درس	فیزیک	شیمی
گزینشگر	حسام نادری	آرش ظریف
گروه ویراستاری	سینا صالحی حسین بصیرترکمپور زهره آقامحمدی	یاسر راش مجتبی محبوب امیرعلی بیات فرزاد جلاج مقدم
مسئول درس	حسام نادری	آرش ظریف
مسئند سازی	علیرضا همایون خواه	امیرحسین توحیدی
ویراستاران (مستحسن سازی)	پرهام مهرآرا سجاد بهارلوی	محسن دستجردی بینا مرادی آتیلا ذاکری

گروه منی و تولید

مدیر گروه	مهرداد ملونیدی
مسئول دفترچه	نرگس غنی زاده
گروه مستحسن سازی	مدیر گروه: محیا اصفری
حقوق نگار	فرزانه خنج اله زاده
ناظر چاپ	سوران نعیمی

گروه آزمون
بنیاد علمی آموزشی قلمچی «وقف عام»
دفتر مرکزی: خیابان انقلاب پون عبا و فلسطین - پلاک ۹۲۳ - تلفن: ۰۲۱-۶۴۶۴

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

فیزیک ۲: الفای الکترومغناطیسی و جریان متناوبه صفحه‌های ۱۰۹ تا ۱۳۰

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

۸۱- اگر سطح حلقه‌ای به مساحت 10 cm^2 با خطوط میدان مغناطیسی یکنواختی به بزرگی 2 T زاویه 30° بسازد، شار مغناطیسی گذرنده از حلقه چند ویر می‌باشد؟






(۴) $\frac{\sqrt{3}}{1000}$

(۳) 0.1

(۲) 0.001

(۱) 0.1

۸۲- نمودار اندازه میدان مغناطیسی گذرنده از حلقه‌ای به شعاع 5 cm که سطح آن به‌طور ثابت، عمود بر خط‌های میدان مغناطیسی قرار دارد، بر حسب زمان به‌صورت شکل زیر است. نمودار نیروی محرکه القا شده در این حلقه بر حسب زمان کدام است؟ ($\pi = 3$)



۸۳- معادله شار مغناطیسی گذرنده از سیم‌لوله‌ای به مقاومت الکتریکی ۲ اهم که شامل ۸۰ دور سیم است و در یک مدار بسته قرار دارد، بر حسب زمان در SI به‌صورت $\Phi = 5 \times 10^{-4} \cos(100\pi t)$ می‌باشد. در بازه زمانی $\frac{1}{100} \text{ s}$ تا $\frac{1}{50} \text{ s}$ ، اندازه جریان متوسط القا شده در سیم‌لوله چند آمپر است؟


(۴) $2/5$

(۳) ۴

(۲) ۲

(۱) 0.8

۸۴- نمودار شار مغناطیسی عبوری از حلقه‌ای رسانا به مقاومت الکتریکی 10Ω بر حسب زمان مطابق شکل زیر است. بر اثر این تغییر شار، چه تعداد الکترون در بازه زمانی صفر تا ۲s در مدار جاری می‌شوند؟ ($e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$)



(۱) $12/5 \times 10^{17}$


(۲) $6/25 \times 10^{19}$

(۳) $6/25 \times 10^{17}$

(۴) $12/5 \times 10^{19}$

محل انجام محاسبات

۸۵- در شکل زیر، سیم راست حامل جریان و حلقه رسانا در صفحه کاغذ قرار دارند. اگر جریان گذرنده از سیم (I) کاهش یابد، جریان القایی در حلقه ثابت ... و اگر جریان تغییری نکند و حلقه به سمت چپ حرکت کند، جریان القایی در حلقه ... می شود.




- (۱) ساعتگرد - ساعتگرد
(۲) پادساعتگرد - پادساعتگرد
(۳) ساعتگرد - پادساعتگرد
(۴) پادساعتگرد - ساعتگرد

۸۶- یکای شار مغناطیسی و ضریب القاوری در SI به ترتیب از راست به چپ ... و ... بوده و شار مغناطیسی ... ضریب القاوری کمیتی ... است.


- (۱) $\Omega \cdot s$ ، Wb، برخلاف، برداری
(۲) $\Omega \cdot s$ ، Wb، همانند، نرده‌ای
(۳) m ، V، برخلاف، برداری
(۴) m ، V، همانند، نرده‌ای

۸۷- در شکل زیر، سطح قاب فلزی بر خط‌های میدان مغناطیسی یکنواخت $\vec{B}$ عمود است. اگر میله رسانای MN را با تندی ثابت v به طرف چپ حرکت دهیم، جریان القایی ایجاد شده در قاب از ... و مقدار آن ... است. (مقاومت الکتریکی قاب را ثابت فرض کنید.)



- (۱) C به D - ثابت
(۲) D به C - ثابت
(۳) C به D - متغیر
(۴) D به C - متغیر

۸۸- در مدار شکل زیر، انرژی مغناطیسی ذخیره شده در القاگر چند میلی ژول است؟ (از مقاومت الکتریکی سیم‌لوله صرف‌نظر شود.)



- (۱) ۲
(۲) ۴
(۳) ۸
(۴) ۱۶

۸۹- معادله جریان - زمان برای جریان متناوبی در SI، به صورت $I = 0.2 \sin \frac{50\pi}{3} t$ است. در چه لحظه‌ای بر حسب ثانیه، برای سومین بار اندازه نیروی محرکه القایی به بیشترین مقدار خود می‌رسد؟

- (۱) ۰/۲۱
(۲) ۰/۱۵
(۳) ۰/۱۲
(۴) ۰/۰۹

۹۰- در مورد مبدل‌ها کدام گزینه نادرست می‌باشد؟


- (۱) برای انتقال توان الکتریکی در فاصله‌های دور تا جایی که امکان دارد باید از ولتاژهای بالا و جریان‌های کم استفاده کرد.
(۲) در خط‌های انتقال توان الکتریکی به طور معمول از ولتاژ در حدود ۴۰۰V استفاده می‌کنند.
(۳) پیچ‌های مبدل را دور هسته آهنی (فرومغناطیس نرم) می‌پیچند.
(۴) ولتاژ تولید شده در نیروگاه تا استفاده در منازل چندین بار تغییر می‌کند.

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه

فیزیک ۳: حرکت بر خط راست + دینامیک و حرکت دایره‌ای: صفحه‌های ۱ تا ۴۶

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اختیاری است.

- ۹۱- نمودار مکان - زمان متحرکی که در مسیری مستقیم حرکت می‌کند، مطابق شکل زیر است. در بازه زمانی $t=0$ تا $t=t'$ به ترتیب از راست به چپ، جهت حرکت و جهت نیروی وارد شده بر متحرک چند بار تغییر کرده است؟



(۱) ۴ و ۴

(۲) ۳ و ۳

(۳) ۴ و ۳

(۴) ۳ و ۴

- ۹۲- دو متحرک A و B همزمان از یک نقطه و از حال سکون به ترتیب با شتاب‌های ثابت a و $\frac{1}{4}a$ بر روی مسیری مستقیم به سوی مقصدی یکسان شروع به حرکت می‌کنند. اگر متحرک A، ۱۵ ثانیه زودتر به مقصد برسد، نسبت سرعت متوسط متحرک A به سرعت متوسط متحرک B در کل حرکت کدام است؟

(۴) $\frac{1}{4}$

(۳) ۴

(۲) $\frac{1}{2}$

(۱) ۲

- ۹۳- در شرایط خلأ، سنگی از بالای صخره‌ای رها می‌شود و $\frac{3}{5}$ ثانیه پس از سقوط به زمین می‌رسد. ارتفاع صخره چند متر است؟ ($g = 10 \frac{m}{s^2}$)


(۴) ۸۰

(۳) ۴۵

(۲) ۶۱/۲۵

(۱) ۱۲۲/۵

- ۹۴- در شکل زیر، نیروهای وارد بر یک جسم نشان داده شده است. اگر جسم در حال تعادل باشد، کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح است؟



(۱) عکس‌العمل نیروی $\vec{F}_N$ ، نیروی $\vec{W}$ است.

(۲) عکس‌العمل نیروی $\vec{F}_1$ ، نیروی $\vec{F}_2$ است.

(۳) عکس‌العمل نیروی $\vec{W}$ ، به سطح زمین اعمال می‌شود.

(۴) عکس‌العمل نیروی $\vec{W}$ ، به مرکز زمین اعمال می‌شود.

- ۹۵- به یک جسم ۵ کیلوگرمی، همزمان چهار نیروی ۲۰، ۱۰، ۵ و ۱۵ نیوتونی وارد می‌شود و جسم در حال تعادل است. اگر فقط نیروی ۲۰ نیوتونی حذف شود و دیگر نیروها با همان اندازه و جهت اثرگذار باشند، اندازه تغییر سرعت جسم بعد از ۴s چند متر بر ثانیه خواهد شد؟

(۴) ۱۶

(۳) ۱۲

(۲) ۸

(۱) ۵

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون  مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

محل انجام محاسبات

۹۶- صندوقی به جرم 80 kg با نیرویی ثابت و افقی به اندازه 480 N از حال سکون روی سطحی افقی کشیده می‌شود. اگر پس از

گذشت 30 ثانیه نیروی افقی حذف شود، صندوق چند ثانیه پس از قطع نیرو می‌ایستد؟ ($\mu_k = 0/4$ و $g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۲۲/۵ (۴)

۱۵ (۳)

۷/۵ (۲)

۳/۵ (۱)

۹۷- فتری به جرم ناچیز و طول عادی 10 cm را از سقف یک آسانسور ساکن آویزان می‌کنیم و به سر دیگر آن وزنه‌ای به جرم m وصل

می‌کنیم تا بعد از تعادل، طول فتر به 13 cm برسد، اگر آسانسور با شتاب ثابت و رو به بالای $1 \frac{\text{m}}{\text{s}^2}$ شروع به حرکت کند، بعد از

ایجاد تعادل، طول فتر چند سانتی‌متر می‌شود؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)

۱۶/۳ (۴)

۱۵/۳ (۳)


۶/۷ (۲)

۱۳/۳ (۱)

۹۸- مطابق شکل زیر، نردبانی به جرم 15 kg به دیوار قائم و بدون اصطکاک تکیه دارد، اگر پایه آن روی سطح افقی در آستانه سر

خوردن باشد، اندازه نیرویی که از طرف دیوار قائم به نردبان وارد می‌شود، چند برابر نیرویی است که از طرف سطح افقی به

نردبان وارد می‌شود؟ ($g = 10 \frac{\text{N}}{\text{kg}}$)



۳/۴ (۱)

۳/۵ (۲)

۴/۳ (۳)

۵/۳ (۴)

۹۹- جسمی روی باسکول در کف آسانسور ساکنی قرار دارد و باسکول وزن جسم را W نشان می‌دهد. در کدام موارد زیر الزاماً

باسکول وزن جسم را کم‌تر از W نشان می‌دهد؟

الف) آسانسور به سمت پایین شروع به حرکت کند.

ب) در حالی که آسانسور به طرف بالا در حال حرکت است، متوقف شود.

پ) بردار شتاب حرکت آسانسور به سمت بالا باشد.

ت) آسانسور به‌صورت کندشونده حرکت کند.

۴) پ و ت


۳) ب و پ

۲) الف و ب

۱) الف و ت

۱۰۰- نمودار اندازه نیروی کشسانی فتری با جرم ناچیز بر حسب طول آن مطابق شکل زیر است. به ترتیب از راست به چپ، طول عادی

فتر بر حسب سانتی‌متر و ثابت فتر بر حسب نیوتون بر متر کدام است؟



۴ و ۶۰۰ (۱)

۴ و ۸۰۰ (۲)

۶ و ۶۰۰ (۳)

۶ و ۸۰۰ (۴)

وقت پیشنهادی: ۱۵ دقیقه


فیزیک ۱: ترمودینامیک صفحه‌های ۱۲۷ تا ۱۴۹

پاسخ دادن به این سؤالات برای همه دانش‌آموزان اختیاری است.

۱-۱ با توجه به قانون اول ترمودینامیک، کدام حالت برای یک فرایند ترمودینامیکی معتبر است؟

- (۱) دستگاه 150J گرما بگیرد، محیط 320J کار انجام دهد و انرژی درونی دستگاه 470J کم شود.
- (۲) محیط 300J گرما بگیرد، محیط 250J کار انجام دهد و انرژی درونی دستگاه 550J کم شود.
- (۳) دستگاه 150J گرما بگیرد، دستگاه 40J کار انجام دهد و انرژی درونی دستگاه 110J زیاد شود.
- (۴) محیط 800J گرما بگیرد، دستگاه 250J کار انجام دهد و انرژی درونی دستگاه 550J کم شود.

۱-۲ نمودار $P-V$ برای مقدار معینی گاز آرمانی در شکل زیر نشان داده شده است. کدام گزینه در مورد تغییرات انرژی درونی



(ΔU) و کار انجام شده بر روی گاز (W) درست است؟


(۱) $W > 0, \Delta U > 0$

(۲) $W < 0, \Delta U > 0$

(۳) $W > 0, \Delta U < 0$

(۴) $W < 0, \Delta U < 0$

۱-۳ در شکل زیر، اندازه کار انجام شده توسط گاز آرمانی در مسیر $A \rightarrow B$ چند ژول است؟ ($1\text{atm} = 10^5\text{Pa}$)



(۱) ۱۰۰


(۲) ۷۰۰

(۳) ۴۰۰

(۴) ۶۰۰

۱-۴ نمودار $P-V$ دو فرایند هم‌دما و بی‌دررو برای مقدار معینی گاز آرمانی مطابق شکل زیر رسم شده است. اگر انرژی درونی گاز در

نقاط B و C را به ترتیب با U_B و U_C نمایش دهیم، در این صورت $U_B - U_C$ برابر با کدام گزینه است؟



(۱) گرمای مبادله شده در فرایند بی‌دررو

(۲) کار انجام شده توسط گاز در فرایند بی‌دررو

(۳) گرمای مبادله شده در فرایند هم‌دما

(۴) کار انجام شده روی گاز در فرایند هم‌دما

۱-۵- انرژی درونی مقدار معینی گاز کامل برابر با $80J$ است. طی یک فرایند ترمودینامیکی، حجم و فشار گاز را به ترتیب ۳ برابر و $\frac{4}{3}$ برابر می‌کنیم. اگر طی این تغییرات، اندازه کار انجام گرفته بر روی گاز برابر با $70J$ باشد، اندازه گرمای مبادله شده بین گاز و محیط چند ژول است؟


۳۲۰ (۴)

۳۱۰ (۳)

۲۴۰ (۲)

۱۷۰ (۱)

۱-۶- مطابق شکل زیر، چرخه‌ای از سه فرایند هم‌دما، هم‌حجم و بی‌دررو تشکیل شده است. اگر گاز در فرایند بی‌دررو $240J$ کار انجام دهد، گرمای مبادله شده در فرایند هم‌حجم چند ژول است؟



۲۴۰ (۱)

-۲۴۰ (۲)

۴۴۰ (۳)

-۴۴۰ (۴)

۱-۷- کدام یک از عبارات‌های زیر، درباره ماشین‌های گرمایی درست است؟

(الف) از نظر تاریخی، نخستین ماشین‌های گرمایی، ماشین‌های درون‌سوز بودند.

(ب) ماشین نیوکامن، ماشین استرلینگ و ماشین بخار، انواع مختلفی از ماشین‌های گرمایی برون‌سوز هستند.

(پ) چرخه یک ماشین بتزیتی شامل شش فرایند است که دو فرایند از آن، با حرکت پیستون همراه‌اند.

(ت) در یک ماشین بتزیتی، فرایندهای انجام شده در ضربه‌های تراکم و قدرت را می‌توان بی‌دررو در نظر گرفت.

(۴) ب و پ

(۳) الف و پ

(۲) ب و ت

(۱) الف و ت

۱-۸- یک ماشین گرمایی در هر چرخه $1500J$ ژول گرما از منبع دمابالا دریافت کرده و $300J$ کار روی محیط انجام می‌دهد. برای این که بازده این ماشین به اندازه ۵ درصد افزایش یابد، باید ماشین را طوری طراحی کنیم که ...

(۱) با ثابت بودن گرمای دریافتی، $300J$ ژول کار بیشتری روی محیط انجام دهد.

(۲) $300J$ ژول گرمای کمتر از منبع دمابالا بگیرد ولی کار انجام شده ثابت بماند.

(۳) با ثابت بودن گرمای دریافتی، $75J$ ژول کار بیشتر روی محیط انجام دهد.

(۴) گزینه‌های ۲ و ۳ هر دو صحیح هستند.

۱-۹- اگر در چرخه یک ماشین گرمایی، تمام گرمای گرفته شده از منبع دمابالا به کار تبدیل شود، قانون اول ترمودینامیک ... قانون دوم ترمودینامیک، نقض ...

(۴) همانند - نمی‌شود

(۳) همانند - می‌شود

(۲) برخلاف - نمی‌شود

(۱) برخلاف - می‌شود

۱۱- کدام یک از عبارات‌های زیر نادرست است؟

(۱) ممکن نیست گرما به خودی خود از جسمی با دمای پایین به جسمی با دمای بالا منتقل شود.

(۲) اگر قانون دوم ترمودینامیک به بیان یخچالی نقض شود، قانون دوم ترمودینامیک به بیان ماشین گرمایی نیز نقض می‌شود.

(۳) در چرخه یک یخچال داریم: $Q_L + W = Q_H$

(۴) در کولر گازی به مانند یخچال، متبع دمابالین، هوا و اجسام درون اتاق و متبع دمابالا، هوای بیرون اتاق است.

وقت پیشنهادی: ۱۰ دقیقه

شیمی ۲: پوشاک، نیازهای پایدار، ناپایداری: صفحه‌های ۹۹ تا ۱۲۳

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اجباری است.

۱۱۱- کدام گزینه درست است؟

- (۱) پلی لاکتیک اسید در شیر ترش شده یافت می‌شود.
- (۲) از پلی استیرن در ظروف یکبار مصرف و از پلی پروپن در سرنگ پلاستیکی استفاده می‌شود.
- (۳) پلیمرهای سبز از فراورده‌های نفتی حاصل می‌شوند.
- (۴) پلی اتن سبک دارای ساختار خطی و پلی اتیلن سنگین دارای ساختار شاخه‌دار است.

۱۱۲- چه تعداد از موارد زیر درست است؟

- (الف) پلیمرهای حاصل از هیدروکربن‌های سیرنشده میل چندانی به انجام واکنش ندارند.
- (ب) هیدروکربن‌های غیرحلقوی که در ساختار خود پیوند دوگانه کربن - کربن در زنجیر کربنی داشته باشد، می‌تواند در شرایط مناسب در واکنش پلیمری شدن شرکت کند.

- (پ) در پلیمرهای طبیعی موجود در شاخ گوزن، گروه عاملی آمینی در واحد تکرار شونده آن وجود دارد.
- (ت) فورمیک اسید بر اثر گزش مورچه سرخ وارد بدن شده و باعث سوزش و خارش در محل گزیدگی می‌شود.

(۱) ۱ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۴

۱۱۳- ۱/۶ کیلوگرم از نوعی پلی آمید سیرشده در مقدار کافی آب و در محیط مناسب آبکافت می‌شود. اگر در پایان ۵۷۵ گرم دی آمین تک

کربنه به دست آید، فرمول مولکولی کربوکسیلیک اسید حاصل کدام است؟ ($O=16, N=14, C=12, H=1: g.mol^{-1}$)

(۱) $C_4H_4O_4$ (۲) $C_4H_8O_4$ (۳) $C_4H_6O_4$ (۴) $C_4H_6O_4$

۱۱۴- چند مورد از موارد زیر درست است؟

- (الف) در حال حاضر مقدار تولید جهانی الیاف پلی استر بسیار بیشتر از الیاف پنبه است.
- (ب) الیاف پنبه از سلولز تشکیل شده که از اتصال تعداد زیادی مولکول‌های گلوکز به یکدیگر به وجود می‌آید.
- (پ) در تولید همه پلیمرهای مقابل، پیوند دوگانه شکسته می‌شود: تفلون، پلی اتن، پلی ویتیل کلرید، پلی استیرن
- (ت) فرایند اسپارش گاز اتن را می‌توان نوعی چگالش دانست.
- (ث) هر ترکیب آلی که در واکنش پلیمری شدن شرکت می‌کند؛ حتماً پیوند دوگانه کربن-کربن در زنجیره کربنی خود دارد.

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۱۵- چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟

- * پروپان همانند پلی اتن یک هیدروکربن کوچک مولکول محسوب می‌شود.
- * مونومر پلیمرهای سازنده ظروف یکبار مصرف و کیسه خون را می‌توان به ترتیب از جایگزینی یک گروه متیل با حلقه بتزنی در مونومر سازنده سرنگ و افزودن یک مول گاز هیدروژن کلرید به یک مول گاز اتین تهیه کرد.
- * با اندازه‌گیری جرم پلیمرها می‌توان به فرمول مولکولی دقیق آن‌ها پی برد.
- * در واکنش اسپارش سیانواتن برخلاف واکنش اسپارش لاکتیک اسید، قدرت نیروهای بین مولکولی در ساختار فراورده، بیشتر از ساختار مونومرهای سازنده آن است.

(۱) ۴ (۲) ۳ (۳) ۲ (۴) ۱

۱۱۶- از واکنش دو مول متانول با مقدار کافی از اگزالیک اسید ($\text{HOOC}-\text{COOH}$) چند گرم فراورده آلی به دست می آید؟ (بازده

درصدی واکنش برابر با ۸۵٪ است.) (ترکیب آلی حاصل دی استر است.) ($\text{H}=1, \text{C}=12, \text{O}=16: \text{g.mol}^{-1}$)

۱۱۰/۵۵ (۴)


۷۳/۹۵ (۳)

۸۷/۵ (۲)

۱۰۰/۳ (۱)

۱۱۷- برای آبکافت کامل ۲ گرم از یک نمونه پلی آمید با ساختار زیر، به چند مولکول آب نیاز است؟

($\text{O}=16, \text{N}=14, \text{C}=12, \text{H}=1: \text{g.mol}^{-1}$)



۲/۴۰۸×۱۰^{۲۲} (۴)

۶/۰۲×۱۰^{۲۲} (۳)

۳/۰۱×۱۰^{۲۲} (۲)

۴/۸۱۶×۱۰^{۲۲} (۱)

۱۱۸- فرمول ساختاری لاکتیک اسید به صورت $\text{H}_n\text{C}-\text{CH}(\text{OH})-\text{C}(=\text{O})-\text{OH}$ می باشد. با توجه به آن چند مورد از مطالب زیر درست هستند؟



(الف) از شیر ترش شده می توان برای تهیه A استفاده کرد.

(ب) پلی لاکتیک اسید از دسته پلیمرهای سبز است.

(پ) از پلی لاکتیک اسید در تولید ظرفهای پلاستیکی یکبار مصرف استفاده می شود.

(ت) مونومرهای B به علت داشتن گروه عاملی هیدروکسیل و کربوکسیل نیاز به

مونومر دیگری برای تشکیل پلیمر ندارد.



۲ (۲)

۱ (۱)

۴ (۴)

۳ (۳)

۱۱۹- از واکنش ۳۳/۳ گرم از یک کربوکسیلیک اسید راست زنجیر که زنجیر هیدروکربنی آن سیر شده است با مقدار کافی از یک

الکل سیر شده، به تقریب ۳/۴۴ گرم آب تولید می شود. درصد جرمی کربن در این اسید چند برابر درصد جرمی اکسیژن

می باشد؟ (بازده درصدی واکنش را ۴۲/۵٪ در نظر بگیرید.) ($\text{O}=16, \text{C}=12, \text{H}=1: \text{g.mol}^{-1}$)

۰/۶۶۷ (۴)

۰/۸۰۰ (۳)

۱/۱۲۵ (۲)

۱/۲۵۰ (۱)

۱۲۰- در شرایط مناسب از واکنش بین ۱/۲ مول متیل آمین با کربوکسیلیک اسیدی با گروه آلکیل خطی و سیر شده ۸۷/۶ گرم از یک آمید

تولید می شود. تعداد اتمهای کربن در یک مولکول از آمید تولید شده کدام است؟ ($\text{O}=16, \text{N}=14, \text{C}=12, \text{H}=1: \text{g.mol}^{-1}$)

۵ (۴)

۴ (۳)

۳ (۲)

۲ (۱)

وقت پیشنهادی: ۱۰ دقیقه

شیمی ۳: مولکول‌ها در خدمت تندرستی؛ صفحه‌های ۳۶ تا ۴۱

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اختیاری است.

۱۲۱- همه گزینه‌های زیر نادرست هستند، به جز:

- (۱) ضد یخ به راحتی در آب حل می‌شود، زیرا دارای مولکول‌های قطبی است و در ساختار خود دارای گروه عاملی کربوکسیل است.
- (۲) بخش چربی دوست صابون‌ها دارای بخش باردار است.
- (۳) وازلین هیدروکربنی سیرشده از گروه آلکان‌ها است که در ساختار خود تنها کربن و هیدروژن دارد و دارای ۷۶ جفت الکترون پیوندی است.
- (۴) در دمای اتاق همه ترکیب‌های یونی به خوبی در آب حل می‌شوند.

۱۲۲- کدام یک از موارد زیر نادرست است؟

- (الف) کار روی رسانایی الکتریکی محلول‌های آبی، پیش‌زمینه ارائه نظریه اسید و باز آرنیوس بود.
 - (ب) هرچه رسانایی الکتریکی محلولی بیشتر باشد، آن محلول اسیدی‌تر است.
 - (پ) اگر در محلول ۰/۱ مولار استیک اسید، غلظت یون هیدرونیوم $1.0 \times 10^{-3} \text{ mol.L}^{-1}$ باشد، درجه یونش آن برابر است با ۱/۳۵
 - (ت) انحلال نمک پتاسیم اسید چرب در آب باعث افزایش غلظت یون هیدروکسید می‌شود.
 - (ث) تعداد یون‌های آزاد شده از انحلال سه مول HF در آب برابر با یون‌های آزاد شده از انحلال سه مول NaOH در آب است.
- (۱) «ب»، «پ» و «ث» (۲) «ب»، «پ» و «ت»
(۳) «ت» و «ث» (۴) «الف»، «ب» و «ث»

۱۲۳- نمونه‌ای آب دارای ۱۱۵۲ ppm مخلوط کاتیون‌های منیزیم و کلسیم است. اگر به ازای هر ۳ گرم یون کلسیم ۵ گرم یون منیزیم وجود داشته باشد، به تقریب چند گرم نمک سدیم فسفات به ۱۰ لیتر از این آب اضافه شود تا یک صابون بتواند در آن کاملاً حل گردد؟

(g.mol^{-1} : O = ۱۶, Mg = ۲۴, Ca = ۴۰, Na = ۲۳, P = ۳۱ و چگالی محلول 1 g.mL^{-1})

- | | |
|--------|--------|
| ۴۵ (۲) | ۴۰ (۱) |
| ۲۴ (۴) | ۶۶ (۳) |

مشابه سؤال‌هایی که با آیکون  مشخص شده‌اند در امتحانات تشریحی وجود دارد.

۱۲۴- در دمای اتاق با توجه به ثابت یونش اسیدهای $\text{HA}(K_a = 9 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$ و $\text{HB}(K_a = 2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$ که

مربوط به دمای 25°C می باشد، کدام نتیجه گیری در این دما همواره درست است؟

(۱) pH محلول آبی HB کوچک تر از pH محلول اسید HA است.

(۲) در دمای 25°C رسانایی الکتریکی محلول آبی HA کمتر از رسانایی الکتریکی محلول آبی HB است.


(۳) غلظت یون A^- در محلول ۰/۱ مولار HA کمتر از غلظت یون B^- در محلول ۰/۱ مولار HB است.

(۴) جرم سدیم هیدروکسید لازم برای خنثی کردن ۰/۵ لیتر محلول ۳ مولار HB کمتر از جرم سدیم هیدروکسید لازم برای خنثی کردن ۰/۵ لیتر محلول سه مولار HA است.

۱۲۵- اگر ۳/۳۶ میلی لیتر گاز N_2O_5 در شرایط STP در ۵۰۰ میلی لیتر آب مقطر به طور کامل حل شود، pH تقریبی محلول به دست

آمده کدام بوده و در این محلول، غلظت یون هیدرونیوم چند برابر غلظت یون هیدروکسید است؟ (گزینه ها را از راست به چپ

بخوانید). ($\log 2 \approx 0/3$, $\log 3 \approx 0/5$) (واکنش در دمای اتاق انجام می شود).



$$3/6 \times 10^{-7} - 2/9 \quad (2)$$

$$3/6 \times 10^{-7} - 3/2 \quad (1)$$


$$1/6 \times 10^{-7} - 2/9 \quad (4)$$

$$1/6 \times 10^{-7} - 3/2 \quad (3)$$

۱۲۶- گاز هیدروژن کلرید حاصل از واکنش گازهای هیدروژن و کلر را در آب حل کرده و نمودار تغییرات pH محلول بر حسب زمان به

صورت زیر است. اگر حجم آب اولیه را ۳ لیتر در نظر بگیریم، پس از ۶ دقیقه از شروع واکنش، محلول حاصل با چند میلی لیتر

محلول یک مولار سدیم هیدروکسید خنثی می شود؟ (از تغییر حجم محلول صرف نظر کنید).




(۱) ۱۵

(۲) ۳۰

(۳) ۱۵۰


(۴) ۳۰۰

۱۲۷- در شکل‌های زیر به ترتیب از راست به چپ چند میلی گرم ماده حل شونده به ظرف (۱) و چند میلی گرم ماده حل شونده به ظرف (۲) افزوده شده است؟ (حجم نهایی محلول موجود در هر ظرف را ۱ لیتر در نظر بگیرید.) ($C = 12, H = 1, O = 16, Na = 23 : g.mol^{-1}$)



- (۱) ۱۹۸۰ و ۴۰
(۲) ۱۹۸ و ۴
(۳) ۱۹۲۰ و ۴
(۴) ۱۹۲ و ۴۰

۱۲۸- آسپرین با ساختار شیمیایی زیر یکی از داروهایی است که در ساختار خود دارای و است و این دارو باعث pH شیره معده می‌شود و همچنین مصرف آن می‌تواند سبب سوزش معده شود.



- (۲) گروه استری، کربوکسیل، افزایش، افزایش
(۴) گروه استری، حلقه آروماتیک، کاهش، کاهش





- (۱) گروه اتری، حلقه آروماتیک، افزایش، کاهش
(۳) حلقه آروماتیک، کربوکسیل، کاهش، افزایش

۱۲۹- اگر غلظت مولار یون $OH^-(aq)$ در یک لیتر محلول لوله بازکن حاوی NaOH برابر $5 \times 10^{-3} mol.L^{-1}$ باشد، چند مورد از مطالب زیر، درباره این محلول در دمای $25^\circ C$ نادرست است؟ ($Na = 23, O = 16, H = 1 : g.mol^{-1}$) (دمار را $25^\circ C$ در نظر بگیرید.) ($\log 5 \approx 0.7$)

- pH آن برابر ۹/۳ است و گل ادریسی در این محلول قرمز رنگ است.
- با دی‌نیتروژن پنتاکسید واکنش می‌دهد.
- در هر لیتر از آن 2×10^{-4} گرم NaOH وجود دارد و مانند پتاس سوزآور (KOH) ماده‌ای خورنده به شمار می‌رود.
- محلول NaOH رنگ کاغذ pH را به آبی تغییر می‌دهد.
- با افزودن یک لیتر آب به این محلول، pH محلول جدید برابر ۱۰ است.

- (۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) ۴

۱۳۰- ۱۰۰ میلی لیتر محلول هیدروکلریک اسید ۰/۰۱ مولار در اختیار داریم. در صورتی که بخواهیم با یک قطره چکان حاوی محلول ۰/۵ مولار سدیم هیدروکسید و با سرعت $0.5 mL.min^{-1}$ آن را خنثی کنیم، نسبت زمانی که طول می‌کشد تا pH محلول به ۲/۳ برسد، به زمانی که طول می‌کشد تا pH محلول به ۲/۷ برسد کدام است و نمودار تغییرات pH محلول در کدام گزینه به درستی آمده است؟ (از تغییرات حجم در محلول نهایی صرف نظر می‌شود).



وقت پیشنهادی: ۱۰ دقیقه

شیمی ۱: آب، آهنگ زندگی، صفحه‌های ۹۸ تا ۱۲۲

پاسخ دادن به این سوالات برای همه دانش‌آموزان اختیاری است.

۱۳۱- با توجه به معادله انحلال پذیری $S = 0.8\theta + 72$ که مربوط به سدیم نیترات است، تعیین کنید که در دمای 283 K با 160 g از این نمک،

به تقریب چند میلی لیتر محلول سیر شده با چگالی 1 g.mL^{-1} می‌توان تهیه کرد؟ ($\text{Na} = 23, \text{N} = 14, \text{O} = 16: \text{g.mol}^{-1}$)

- ۳۲۷ (۱) ۳۲۰ (۲) ۵۰۰ (۳) ۳۸۰ (۴)

۱۳۲- در کدام گزینه هر دو ترکیب از نظر حالیت در آب ویژگی یکسانی دارند؟

- (۱) سدیم کلرید - نقره کلرید
(۲) پتاسیم نیترات - کلسیم سولفات
(۳) پتاسیم کلرید - سدیم نیترات
(۴) لیتیم سولفات - باریم سولفات

۱۳۳- نمودار زیر مربوط به انحلال پذیری پتاسیم کلرید در آب است. در دمای اتاق (25°C)، چند گرم از آن در 400 g گرم آب باید حل

شود تا محلول سیر شده بدست آید؟




۱۳۴- با قرار دادن مقداری از خون فردی در دستگاه گلوکومتر، نمایشگر عدد ۹۶ را نشان می‌دهد. به تقریب غلظت گلوکز برحسب

ppm و میلی مولار گلوکز به ترتیب از راست به چپ در این نمونه خون کدام است؟ (گزینه‌ها را از راست به چپ بخوانید.)

($\text{C} = 12, \text{H} = 1, \text{O} = 16: \text{g.mol}^{-1}$, $d_{\text{خون}} = 1\text{ g.mL}^{-1}$)

- ۵۳، ۹۶۰۰ (۱) ۵۳، ۹۶۰ (۲) ۵۳، ۹۶۰۰ (۳) ۵۳، ۹۶۰ (۴)

۱۳۵- اگر در محلول‌های آبی (a) تا (e) هر ذره هم ارز با 0.2 mol باشد، چند مورد از عبارتهای زیر درست است؟ ($1\text{ g.mL}^{-1} = d_{\text{محلول‌ها}}$)


• مولاریته محلول (a) با (e) برابر است.

• غلظت مولی محلول بدست آمده از مخلوط کردن دو محلول (a) و (c) برابر $2/4\text{ mol.L}^{-1}$ است. (حل شونده‌ها با هم واکنش نمی‌دهند.)

• اگر غلظت ppm دو محلول (d) و (e) با هم برابر باشد، جرم مولی حل شونده (d) نصف جرم مولی حل شونده (e) است.

- ۱ (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۴ (۴) صفر

۱۳۶- چند مورد از مطالب زیر، درست است؟

(ا) نقره کلرید و باریم کلرید از جمله مواد نامحلول در آب به شمار می‌آیند.


(ب) انحلال پذیری لیتیم سولفات در آب با افزایش دما کاهش می‌یابد.

(پ) در دمای 25°C ، می‌توان از استون، محلول سیر شده در آب تهیه کرد.

(ت) اغلب سنگ‌های کلیه از رسوب برخی نمک‌های کلسیم‌دار در کلیه‌ها تشکیل می‌شوند.

- ۳ (۱) ۴ (۲) ۱ (۳) ۲ (۴)


۱۳۷- ۷۵ میلی لیتر محلول ۵۱ درصد جرمی نقره نیترات با چگالی 1.06 g.mL^{-1} با چند گرم منیزیم کلرید به طور کامل واکنش خواهد داد؟ (معادله واکنش موازنه نشده است.) ($N=14, O=16, Mg=24, Cl=35.5, Ag=108; \text{g.mol}^{-1}$)



۲۴/۶۵ (۴)


۲۲/۸ (۳)

انحلال پذیری
($\text{g} / 100 \text{gH}_2\text{O}$)




۱۶/۷ (۲) ۱۷/۱ (۱)
۱۳۸- کدام یک از نمودارهای زیر، نادرست است؟


(D) گشتاور دو قطبی




مجموع غلظت مولی یون ها در
محلول M مولار منیزیم سولفات



نقطه جوش ($^{\circ}\text{C}$) ترکیبات دوتایی
هیدروژن دار گروه ۱۷



۱۳۹- با توجه به شکل داده شده که چگونگی تولید آب شیرین از آب شور را نشان می دهد، کدام یک از موارد زیر نادرست است؟



- الف) غلظت آب خروجی از A بیشتر از آب شور ورودی است.
ب) آب شیرین از مخزن بالا به مخزن پایین منتقل می شود.
پ) این دستگاه بر اساس فرایند اسمز عمل می کند.
ت) از این روش می توان برای تولید آب آشامیدنی استفاده کرد.

- (۱) الف
(۲) الف و ب
(۳) پ و ت
(۴) پ

۱۴۰- کدام گزینه از لحاظ درستی یا نادرستی یا سایر گزینه ها متفاوت است؟

- (۱) مولکول CH_4 برخلاف مولکول H_2S در میدان الکتریکی جهت گیری نمی کند.
(۲) نقطه جوش HF به دلیل قوی تر بودن پیوند هیدروژنی در مقایسه با مولکول های H_2O ، بالاتر است.
(۳) گشتاور دو قطبی مولکول CO همانند مولکول HCl مخالف صفر است.
(۴) مقایسه نیروی بین مولکولی هالوژن های دوره سوم تا پنجم در دمای 25°C و فشار 1 atm به صورت $\text{I}_2 > \text{Br}_2 > \text{Cl}_2$ درست است.



دفترچه سؤال

آزمون هوش و استعداد

(دوره دوم)

۲۸ شهریور

تعداد کل سؤالات آزمون: ۲۰
زمان پاسخ‌گویی: ۳۰ دقیقه

گروه فنی تولید

مسئول آزمون	حمید لنجان‌زاده اصفهانی
ویراستار	فاطمه راسخ
مدیر گروه مستندسازی	محیا اصغری
مسئول درس مستندسازی	علیرضا همایون‌خواه
طراحان	حمید اصفهانی، فاطمه راسخ، سجاد محمدنژاد، حمید گنجی، حامد کریمی، فرزاد شیرمحمدلی
حروف‌چینی و صفحه‌آرایی	معصومه روحانیان
ناظر چاپ	حمید عباسی

برای مشاهده پاسخ‌ها، به صفحه شخصی خود در سایت کانون مراجعه کنید.

استعداد تحلیلی

۳۰ دقیقه

۲۵۱- عبارتهای زیر با تغییر، از یک متن انتخاب شده است. کدام مورد نادرستی نگارشی دارد؟

- (۱) به عقیده ناصر خسرو، خردی که در بند نیازهای حیوانی بشر نباشد، او را به همراهی دین، به رستگاری می‌رساند.
- (۲) اما ناصر خسرو آن چیزی را خرد واقعی می‌شمارد که انسان را به جانب دین سوق دهد و در تلازم و همگام با شرع باشد.
- (۳) ناصر خسرو در این مورد خشک و متعصب است و هر دیدگاهی که مغایر با آنچه در ذهن اوست را رد می‌کند.
- (۴) در واقع، خردستانی ناصر خسرو در چارچوب اعتقادات دینی و مذهبی اوست و با مبانی آن ارتباط تنگاتنگ دارد.

۲۵۲- واژه‌های اول و یازدهم عبارت حاصل از مرتب کردن کلمه‌های زیر به ترتیب کدامند؟

- «ادبیات - اسلامی - خورده‌است - نیست - ایرانی - فارسی - با - عرفان - گره - شکی - که - و»
- (۱) شکی - فارسی
 - (۲) ادبیات - گره
 - (۳) ادبیات - فارسی
 - (۴) شکی - گره

۲۵۳- با همه حروف بهم‌ریخته «ر س ف ک م و و ه ی» نام یک کشور و نام پایتخت آن ساخته می‌شود، ولی یک حرف اضافه می‌ماند. آن حرف کدام است؟ از هر حرف باید به همان اندازه‌ای که هست استفاده شود.



(۲) ف

(۴) ه

(۱) ر

(۳) ک

۲۵۴- اگر حروف عبارت «تک‌درخت به پای طوفان نشسته» را به ترتیب حروف الفبا از راست به چپ بنویسیم، چهارمین حرف سمت چپ اولین حرف از سمت راست دومین حرف از سمت راست، کدام خواهد بود؟ حروف تکراری را تنها یک بار در نظر بگیرید.

(۲) ت

(۴) د

(۱) پ

(۳) خ

۲۵۵- در کلمه «دارآباد» سه جفت حرف «د - ر»، «آ - ب» و «ب - ا» به ترتیب دارای یک فاصله، بدون فاصله و بدون فاصله هستند و در الفبا نیز همین تعداد فاصله را دارند. یعنی فاصله بین دو حرف خاص در آن کلمه، با فاصله بین آن دو حرف خاص در الفبا برابر است. چند جفت حرف با این ویژگی‌ها در کلمه «آفتاب‌پرست» وجود دارد؟

(۲) دو

(۴) چهار

(۱) یک

(۳) سه

۲۵۶- در ادامه الگوی «الف ب ت ج د ش ...» کدام جفت حروف با همین ترتیب دیده می‌شود؟

- (۱) ف ن
(۲) ف م
(۳) غ ن
(۴) غ م

۲۵۷- کدام ضرب‌المثل با بیت زیر هم‌معناست؟

«در همه کاری که درآیی نخست / رخته بیرون شدنش کن درست»

(۱) اول چالهش رَ بکن، بعد متاره ش رَ بدزد

(۲) مار تا راست نشد تو سوراخ نرفت

(۳) وای از روزی که داروغه دزد باشه

(۴) موش به سوراخ نمی‌رقت جارو به دمش می‌بست

* در یک جدول سودوکوی چهار در چهار، هر ردیف و هر ستون دقیقاً دارای یکی از عددهای ۱، ۲، ۳ و ۴ است. بر این اساس به دو پرسش بعدی پاسخ دهید.

۲۵۸- برای حل جدول سودوکوی زیر، یعنی تعیین عدد همه خانه‌ها، عدد حداقل چند خانه دیگر آن باید کامل مشخص شود؟

۱			
	۳		
			۴
	۲		

(۱) یک خانه

(۲) دو خانه

(۳) سه خانه

(۴) نیاز نیست عدد خانه دیگری مشخص شود.

۲۵۹- جدول سودوکوی زیر به چند حالت کاملاً حل می‌شود؟

۱			
	۱		۲
		۱	
۳			۱

(۱) یک حالت

(۲) دو حالت

(۳) سه حالت

(۴) چهار حالت

۲۶۰- یک مربی فوتبال در دوران حرفه‌ای خود، ناکتون صد و پتجاه بازی سرمربیگری و آمار پتجاه درصد پیروزی را ثبت کرده است. این سرمربی حداقل

چند بازی دیگر باید سرمربی باشد تا آمار پیروزی‌هایش را به حداقل شصت درصد برساند؟

(۱) ۱۰

(۲) ۲۴

(۴) ۵۲

(۳) ۳۸

۲۶۱- صد جعبه از یک کالا را با تخفیف بیست درصدی فروختیم، حداقل چند جعبه از همان کالا را با افزایش قیمت پنج درصدی بفروشیم که در مجموع

زیان نکرده باشیم؟

۲۱۰ (۲)

۱۴۰ (۱)

۴۰۰ (۴)

۳۰۵ (۳)

۲۶۲- برای انجام یک کار، ده کارگر استخدام شده بودند ولی پس از شش روز کار، نیمی از آنان مجبور شدند کار را ترک کنند. در نتیجه، انجام کار باقی مانده شش

روز بیشتر طول کشید. اگر کارگرها کار را ترک نمی کردند، کل کار از آغاز چند روزه تمام می شد؟ کارگرها مهارت کاری یکسان دارند.

۱۲ (۲)

۱۰ (۱)

۱۸ (۴)

۱۶ (۳)

۲۶۳- با قطبی ابتدا یک دایره و سپس بار دیگر، یک مربع ساختیم. اختلاف مساحت این دو، برابر $\frac{9\pi^2}{4} - 9\pi$ واحد مربع شد. طول قطب چند واحد بوده است؟

۲۱ (۲)

6π (۱)

۲۷ (۴)

8π (۳)

۲۶۴- پنج کتاب با عنوان های «الف، ب، پ، ت، ث» باید به شکلی در یک قفسه کنار هم چیده شوند که کتاب های «الف و ب» کنار هم باشند و

کتاب های «ت و ث» کنار هم نباشند. چند حالت برای این کنار هم قرار گرفتن کتاب ها هست؟

۱۸ (۲)

۱۵ (۱)

۲۴ (۴)

۲۱ (۳)

۲۶۵- به جای علامت سؤال الگوی عددی زیر، کدام عدد را می توان قرار داد؟

۹	۸
۲۱	۱۴

(۱)

۵	۲
۳	۶

(۲)

۱۹	۶۰
۱۳	۳۹

(۳)

۷۰	?
۱۸	۹

(۴)






۱ (۱)

۲ (۲)






۳ (۳)

۴ (۴)



۲۶۶- سه برگه کاغذ شفاف مربع شکل و هم اندازه را روی هم انداختیم و چرخاندیم تا شکل زیر حاصل شود. کدام گزینه یکی از این سه برگه نیست؟







۲۶۷- برگه تا و سوراخ شده کدام گزینه را اگر باز کنیم ممکن است شکل زیر حاصل شود؟




۲۶۸- از شکل گسترده زیر مکعب مستطیلی با کدام نما ساخته نمی شود؟ پشت برره کاملاً سفید است.




۲۶۹- کدام حجم از چرخش دیگر حجمها حاصل نشده است؟



۲۷۰- در تصویرهای زیر، نمای شکلی سه‌بعدی از سه جهت نشان داده شده است.



نمای شکل سه‌بعدی دیگری از سه جهت به همین شکل نشان داده شده است.



این حجم حداکثر از چند مکعب واحد تشکیل شده است؟

۱۴ (۲)

۱۳ (۱)

۱۶ (۴)

۱۵ (۳)



منابع مناسب هوش و استعداد

دوره دوم

